

Vegetationsskizze
vom Oberlaufe der Schtschara
(Gouv. Minsk und Grodno)

INAUGURAL-DISSERTATION

zur
Erlangung der Doktorwürde

genehmigt

VON DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT

der

Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin.

Von

Ferdinand Tessendorff
aus Talböckelheim (Kr. Kreuznach).



Tag der Promotion: 15. März 1921.

**Vegetationskunde
vom Oberlande der Schicht**

(Gemeinsam mit (Lindner))

INANGURIAL DISSERTATION

Referenten: **Professor Dr. Engler**
Professor Dr. Haberlandt

Erklärung der Doktorwürde

gezeichnet

VON DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT

der

Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin

von

Friedrich Tessenhardt
aus Tilsit (Kreis Königsberg)

Die Druckerei des Jahres 1900



Vegetationsskizze vom Oberlaufe der Schtschara

(Gouv. Minsk und Grodno.)

Von

Ferdinand Tessendorff.

Aus: Bericht der Freien Vereinigung
für Pflanzengeographie und systematische Botanik
für das Jahr 1920.

Berlin 1921
Verlag Max Lande.

Lebenslauf.

Ich, Konrad Ferdinand Tessendorff, wurde geboren auf dem Heinberger Hofe zu Talböckelheim im Kreise Kreuznach am 1. Dezember 1879 als Sohn des Landwirts Ludwig Tessendorff und seiner Ehefrau Bertha geb. Kissel und im evangelischen Bekenntnisse erzogen. Das Reifezeugnis erhielt ich Ostern 1898 an dem Gymnasium zu Kreuznach, das ich von Ostern 1889 bis Ostern 1898 besuchte. Dann bezog ich die Universität Berlin, um hier bis Ende des Sommer-Semesters 1902 Mathematik und Naturwissenschaften zu studieren. Im Jahre 1905 bestand ich in Berlin die Oberlehrerprüfung und wurde zum 1. Oktober 1907 als Oberlehrer am Helmholtz-Realgymnasium in Berlin-Schöneberg angestellt. Seit 1. Oktober 1920 leite ich diese Anstalt als Direktor. Meiner Ostern 1909 mit Paula Ackva aus Kreuznach eingegangenen Ehe sind zwei Töchter entsprossen.

Während meiner Studienzeit hörte ich bei den Herren Professoren: Ascherson †, Branca, Dessoir, Diels, Engler, Fischer †, Frobenius †, Fuchs †, Graebner, Knoblauch †, Liebisch, Münch †, Plank, F. E. Schulze, H. A. Schwarz, Schwendener †, Stumpf, Thoms, Warburg. Ihnen allen schulde ich herzlichen Dank.

Inhalts-Verzeichnis.

Einleitung.

Schilderung der Pflanzenvereine.

I. Sandboden mit tiefem Grundwasserstand.

1. Calluna-Heide.
2. Sandfeldgemeinschaft.
3. Kiefernheide.

II. Sandboden mit mittlerem Grundwasserstand.

4. Kiefernwald.
5. Kiefern-Mischwald.
6. Buschtrift.

III. Sandboden mit hohem Grundwasserstand.

7. Fichten-Mischwald.
8. Wacholdertrift (mit Anhang: Wiesen) nebst den Varianten:
 - 8 b) Anmoorige Trift,
 - 8 c) Erlen-Wacholder-Trift.
9. Vegetation feuchter Gräben:
 - I. im Waldgelände,
 - II. im offenen Gelände.

IV. Schlamm Boden (beginnende Verlandung und Torfbildung).

10. Erlenfließ.
11. Ufer-Sumpf (mit Anhang: Ufer des Wygonoskojesees).

V. Torfboden.

12. Wiesenmoor.
13. Bruchwald.
14. Waldmoore:
 - I. Flachmoor im Mischwald,
 - II. Uebergangsmoor im Mischwald.
15. Weiden-Strauchmoor.
16. Birken-Moorwald.
17. Birken-Strauchmoor.
18. Chamaedaphne-Hochmoor.

VI. Kulturland.

19. Ackerrain-Gemeinschaft.
20. Brachäcker-Flora.
21. Unkrautflora bebauter Aecker.
22. Ruderalflora.

Sukzessionen.

Vergleiche mit anderen Gebieten.

1. Bialowies.
2. Kongreß-Polen.
3. Polnisch-Livland.
4. Ostpreußen.
5. Poljesje.

Floristisch-Statistisches und -Geographisches.

Literaturliste.

Inhalts-Verzeichnis.

Das Material zur vorliegenden Arbeit sammelte ich im Felde während der Monate Juni 1917 bis April 1918 am Nordrande des Poljesje im Gebiete der Schtschara (südlich von Baranowitschi). Wenn ich auch zeitlich durch den Dienst und räumlich durch die Frontverhältnisse bei der Durchforschung des Gebietes sehr eingeengt war, glaube ich doch einen befriedigenden Ueberblick über die Vegetation und ihre Gliederung geben und damit einen Beitrag zur Kenntniss der Pflanzenwelt Weißrußlands liefern zu können, eines Landes, das zu seinem größten Teile pflanzengeographisch bislang so gut wie unbekannt war. Wenn mir dies einigermaßen gelungen ist, so danke ich das vor allem dem Entgegenkommen meiner militärischen Vorgesetzten, in erster Linie meines Batterieführers, Herrn Hauptmann Weegmann. Schon während meines Aufenthaltes im Felde hatte ich mich der Unterstützung der Herren Prof. Dr. L. Diels in Berlin-Dahlem und Prof. Dr. J. Abromeit in Königsberg i. Pr. und nach der Heimkehr der Hilfe auch der Herren Geh. Ober-Regierungsrat Prof. Dr. A. Engler und Prof. Dr. P. Graebner in Berlin-Dahlem zu erfreuen. Das gesammelte Pflanzenmaterial befindet sich im Herbarium des Botan. Museums in Berlin-Dahlem, Dubletten im Herbarium Königsberg i. Pr.

Einleitung.

In dem Dreieck zwischen den westrussischen Städten Brest-Litowsk, Mohilew und Kiew liegt ein gewaltiges Sumpfgebiet, „Poljesje“ — d. i. „Waldland“ — oder „Rokitno-Sümpfe“ genannt, eine Niederung von rund 87 000 qkm Fläche. In der schwach nach Osten geneigten Längsachse strömt der Pripjet, der zahlreiche Nebenflüsse von Norden und Süden empfängt, ohne doch eine genügende Entwässerung des Beckens bewerkstelligen zu können. Aus der Sumpfebene erheben sich einzelne Sandinseln, die die Siedelungen tragen. Auf

diesen trockenen Schilden drängt sich die spärliche Bevölkerung — 5,8 Einwohner auf den Quadratkilometer — zusammen, während meilenweite Flächen gänzlich unbewohnt sind. Seen, Sümpfe, Moore und Bruchwald nehmen den weitaus größten Teil des Gebietes ein. Seit 1875 hat die russische Regierung eine groß angelegte Entsumpfung des Poljesje eingeleitet, die schon beträchtliche Strecken in einen der Kultur etwas zugänglicheren Zustand übergeführt hat.¹

Die Niederschläge betragen im Jahre durchschnittlich 588 mm, die sich folgendermaßen auf die einzelnen Jahreszeiten verteilen: Frühjahr 118 mm, Sommer 261 mm, Herbst 144 mm, Winter 65 mm.


Das Poljesje wird im Norden von diluvialem Hügellande — zum „West-russischen Landrücken“ gehörig — begrenzt, das die Wasserscheide zwischen dem Schwarzen Meer und der Ostsee trägt. An einer Stelle befindet sich jedoch eine Anzapfung der Sumpfschüssel nach Norden hin. Dort tritt die Schtschara vom Hügellande aus in das Poljesje hinein, durchfließt es auf eine kurze Strecke, biegt wieder heraus, bricht durch die Hügelplatte und strebt dem Njemen zu. So ergibt sich auf kürzere Strecke eine Verlegung der großen Wasserscheide von der Randerhebung in die Niederung hinein.

Hier befindet sich das von mir untersuchte Gebiet, teils dem Diluvium, mehr noch dem Alluvium angehörend, begrenzt im Norden etwa vom 53. Breitengrade, im Osten von der Schtschara, im Westen von deren Nebenflusse Myschanka; im Süden bis zum Wygonoskoje-See reichend. Politisch rechnet dies Gebiet zu den Kreisen Nowogrodek, Sluzk und Pinsk des Gouvernements Minsk und zum Kreise Slonim des Gouvernements Grodno. Größere Ortschaften sind Lipsk, Ostrow, Kriwoschin. Siehe im übrigen die Karte I.

Zwischen den Talauen der Schtschara und der Myschanka schiebt sich zungenförmig ein Ausläufer der diluvialen Hügelplatte nach Süden, sich immer mehr in das Becken des Poljesje verflachend. Ihm sind einige größere und kleinere Sandschollen vorgelagert, die sich nur wenige Meter über das umgebende Niederungsgebiet erheben. Auch die Hügelzunge weist in der Hauptsache sandige Böden auf. Flache Geländekuppen zeigen mehr lehmige, zum Teil auch kiesige Decken. Gelegentlich findet man Geschiebe von erheblicherer Größe. Ueber die erdgeschichtliche Vergangenheit West-Rußlands siehe die Arbeit von W. Schottler (1919). Was darin über die bodenbildenden Ablagerungen, über die Waldböden und ihre Beziehungen zum Pflanzenwuchs für Bialowies gesagt ist, dürfte im allgemeinen auch für den Schtschara-Bezirk zutreffen. Eigentümlich ist dem Gebiete in weiter Verbreitung eine kräftige Schluffbildung, d. i. eine Verhärtung des Sandes, in etwa

¹ Weitere Angaben allgemeiner Natur siehe bei Immanuel (1894) und Kuchinka (1911). Literaturliste am Schlusse.

1 m Tiefe, die zur Versumpfung des diluvialen Geländes beträchtlich beiträgt. Dem Diluvium sind breite Talsandböden vorgelagert. Ueber die gewaltigen



Torfbildungen des Poljesje wird weiter unten die Rede sein. Die höchsten Kuppen erreichen etwa 200 m, die tiefste Stelle — Mündung der Myszanka — liegt bei 150 m Meereshöhe.

Allem Anschein nach ist diese Gegend vor dem Kriege floristisch vollkommen unbekannt geblieben. Weder in der russischen noch in der polnischen Literatur ließ sich eine Hinweisung finden. Aus der Umgegend von Griwda, am gleichnamigen Flusse etwa 75 km nach Westen hin auf dem Hügellande gelegen, gibt es eine knappe Pflanzenliste von L. Reinhard (1891). An einigen Stellen, etwa 100 km nach Osten hin gelegen, hat K. Regel (1913) Beobachtungen über die Vegetation des Poljesje gemacht. Die Pflanzenwelt des Poljesje im ganzen behandeln die Arbeiten von G. J. Tanfiljew (1895) und J. Paczowski (1900), beide keineswegs erschöpfend. Schließlich ist noch die „Flora von Polnisch-Livland“ von E. Lehmann zu erwähnen, die bei ihren Standortsangaben auch das Poljesje einbezieht.

Während des Krieges gab die deutsche Militärforstverwaltung in Białowieża — etwa 125 km nach Westen hin gelegen — eine Reihe von Aufsätzen (P. Graebner 1918, K. Rubner 1918, W. Schottler 1919 usw.) heraus, die auch für uns von Interesse sind. Im hier zur Behandlung stehenden Gebiete selbst machte Oberstabsarzt Dr. Hilbert (Sensburg) von Anfang Juli bis Anfang September 1916 Aufzeichnungen, und zwar in der Uebergangszone zwischen Diluvium und Alluvium (Dorf Tuchowitschi). Die Notizen des leider 1918 im Westen Gefallenen standen mir zur Verfügung (siehe auch Literaturliste). Auch Oberarzt Dr. Carnap (Remscheid-Hasten) teilte mir eine Reihe von Beobachtungen mit.

Vorherrschend ist im Schtschara-Gelände der Wald: Kiefernwald, Mischwald, Bruchwald und Moorwald. Der Kiefernwald erinnert in vielem an den entsprechenden Typus des norddeutschen Flachlandes. Recht eigenartig mutet dagegen der Mischwald an. Er erscheint in zwei charakteristischen Ausbildungen: Kiefer vorherrschend, daneben Hainbuche, Eiche, Spitzahorn, Fichte, auf trocknerem Gelände; Fichte vorherrschend, daneben Hainbuche, Eiche, Spitzahorn, Esche, Kiefer auf feuchteren Böden. Der Kiefern-mischwald ist erheblich lichter als der Fichtenmischwald. Bruchwälder erstehen auf dem Schlamm-boden der Fließe, die sich in langsamem Gefälle vom Hügelland nach den Niederungen hinziehen, als Erlenbrücher („Erlenfließ“), dagegen als Erlen-Moorbirken-Bruchwald auf Torfboden mit reichem Nährgehalt an der Schtschara im Randteile des Poljesje. Im Poljesje selbst erscheinen Moorwälder mit reinem Moorbirken-Bestand. Ueber die Entstehung der Bruch- und Moorwälder siehe unten das Kapitel über die Sukzessionen.

Heidebildungen sind örtlich beschränkt, — die echten Heiden mehr noch als die Kiefernheiden, — eine Tatsache, die sich aus der kontinentalen Lage des Gebietes wohl verstehen läßt.

Moorflächen weist das Hügelland und sein Saum in Form von Waldmooren (Flach- und Uebergangsmoore), das Flußalluvium als Wiesenmoore

— vom Bruchwald auf Moorboden war schon die Rede — und vor allem das Poljesje auf, das ja in seiner Gesamtheit eine riesenhafte Moorbildung ist, die im untersuchten Teile hauptsächlich Strauchmoor (meist von Uebergangsmoorcharakter), daneben Hochmoor in geringerer Ausdehnung und den schon erwähnten Birken-Moorwald umfaßt.

Auf dem Diluvium sind die besseren Böden in nicht unbeträchtlichem Maße in Kultur genommen. Ackerfluren, zurzeit meiner Anwesenheit vielfach brachliegend, und Weide-Triften wechseln ab. Echte Wiesen sind wenig vorhanden. Dagegen werden die Wiesenmoore im Tale der Schtschara, der Myschanka und der Lipnitsa, einem von der Diluvialzunge der Schtschara zustrebenden kleineren Nebenflusse, der Grasnutzung unterzogen. Die Poljesje-Flächen werden durch Mahd und Beweidung der Viehhaltung nur in geringem Maße dienstbar gemacht. Die oben erwähnte große Entsumpfung hat gerade den behandelten Winkel anscheinend kaum in ihre Kreise bezogen.

Die weiten Waldungen sind vom Menschen nur wenig beeinflußt und bleiben — besonders die Bruch- und Moorwälder — fast völlig sich selbst überlassen. Auch die Moorflächen bieten Bilder einer Ursprünglichkeit, wie wir sie in unserem Vaterlande nur selten mehr sehen. Daher mußte mir ganz besonders an der Analysierung der Pflanzengesellschaften gelegen sein. Leider war mir die Kürze der zur Untersuchung zur Verfügung stehenden Zeit beim Eindringen in die Zusammenhänge der Lebensbeziehungen sehr hinderlich, so daß ein völliges Ausschöpfen dieser für die Biocoenologie so wertvollen Dokumente einer fast unberührten Vegetation nicht erreicht werden konnte. Zum vollen Herausschälen der ökologischen oder synusologischen (G a m s, 1918) Einheiten gehört doch eine weit längere Beobachtungsdauer. Ich mußte mich infolgedessen in der Hauptsache mit den topographischen Vegetations-einheiten, den „Biocoenosen“¹ (G a m s), begnügen. Immerhin ist mehrfach der Versuch gemacht, innerhalb der Biocoenosen möglichst die „Assoziationen“ (nach G a m s : „Synusien 3. Grades“) herauszuarbeiten.

Bei der Charakterisierung der Einheiten habe ich mich nicht darauf beschränkt, die für die Physiognomie wesentlichen Arten herauszuheben. Auf Grund zahlreicher genauer Einzelaufnahmen jeder natürlichen Gesellschaft an möglichst vielen verschiedenen Oertlichkeiten wurden die „konstanten“ Arten (siehe G r a d m a n n, 1909, p. 99) ermittelt und auf sie in der Hauptsache die Diagnose gestützt. Die „lokalen“ Arten sind in die Gesamtlisten der einzelnen Biocoenosen mit aufgenommen. In diesen Listen kommen die von D r u d e

¹ Mit G a m s halte ich es für empfehlenswert, das in der Literatur allzu verschieden gefaßte Wort „Formation“, das im Sinne von Flahault und Schröter (1910) und auch Warming (1920) gebraucht bei Beschränkung auf einen Florenbezirk etwa dasselbe besagt wie „Biocoenose“, durch einen eindeutigen Ausdruck zu ersetzen.

eingeführten Häufigkeitsbezeichnungen (soc., greg., cop., sp., sol.) zur Verwendung. „Bestandeseigene“ („formationsstete“) Arten sind durch einen vorgesetzten Stern gekennzeichnet. Doch wurde von dieser Kennzeichnung mit der Vorsicht Gebrauch gemacht, die die lückenhafte Erforschung gebot. Im übrigen stimme ich mit Wangerin (1915, p. 17) überein, wenn er den Begriff der „Leitpflanze“ von dem der Formationsstetigkeit loslöst und ihn „für die der Menge nach stärker tonangebenden und deshalb auch für die Physiognomie wesentlichen Bestandteile“ reserviert.

Der von C a j a n d e r (1909), G a m s (1918, p. 443) u. a. ausgesprochenen Ansicht, daß sich im Unterwuchs der Wälder Typen ausscheiden lassen, deren Verbreitung keineswegs mit der der Baumarten zusammenfällt, daß also die Bodenvegetation durch die Bestand bildende Holzart in ziemlich geringem Grade beeinflußt wird, kann ich mich nach meinen Befunden an der Schtschara nur anschließen. Eine Stütze dieser Ansicht ist besonders die Parallelität zwischen den Assoziationen des „Kiefernwaldes“ und des „Kiefern-mischwaldes“. Auch zwischen den Assoziationen des „Kiefern-mischwaldes“ und des „Fichtenmischwaldes“ lassen sich Parallelen finden. Eine gewisse Beeinflussung durch die Bäume ist natürlich vorhanden, doch hängt sie hauptsächlich von dem Grade der Beschattung ab und weit weniger von der gerade vorherrschenden Art. Man könnte die beiden ersten der eben genannten Biocoenosen zusammenlegen, das Ganze nach den Assoziationen der Bodenvegetation gliedern und bei jeder Assoziation nach der Baumschicht unterteilen.

Die Behandlung der topographischen Einheiten habe ich nach den edaphischen Bedingungen (Bodenart, Feuchtigkeit usw.) gegliedert und bin dabei zu folgendem Schema gekommen:

- I. Sandboden mit tiefem Grundwasserstand:
 1. Calluna-Heide.
 2. Sandfeldgemeinschaft.
 3. Kiefern-Heide.
- II. Sandboden mit mittlerem Grundwasserstand:
 4. Kiefernwald.
 5. Kiefern-Mischwald.
 6. Buschtrift.
- III. Sandboden mit hohem Grundwasserstand:
 7. Fichten-Mischwald.
 8. Wacholdertrift (mit Anhang: Wiesen) nebst den Varianten:
 - 8 b) Anmoorige Trift,
 - 8 c) Erlen-Wacholder-Trift.

9. Vegetation feuchter Gräben:

I. im Waldgelände,

II. im offenen Gelände.

IV. Schlammboden (beginnende Verlandung und Torfbildung):

10. Erlenfließ.

11. Ufer-Sumpf (mit Anhang: Ufer des Wygonoskojesees).

V. Torfboden:

12. Wiesenmoor.

13. Bruchwald.

14. Waldmoore:

I. Flachmoor im Mischwald,

II. Uebergangsmoor im Mischwald.

15. Weiden-Strauchmoor.

16. Birken-Moorwald.

17. Birken-Strauchmoor.

18. Chamaedaphne-Hochmoor.

VI. Kulturland:

19. Ackerrain-Gemeinschaft.

20. Brachäcker-Flora.

21. Unkrautflora bebauter Aecker.

22. Ruderalflora.

Ueber die örtliche Verteilung der Pflanzenvereine in dem Gebiete läßt sich zusammenfassend sagen, daß die unter I und II angeführten den diluvialen Böden des Hügellandes angehören, daß Gruppe III und IV hauptsächlich die Uebergangszone zwischen Hügelplatte und Poljesje besiedeln und daß Gruppe V neben einigen Alluvialkolonien im Diluvium die Masse der Poljesje-Vegetation umfaßt.

Schilderung der Pflanzenvereine.¹

1. Calluna-Heide.

Die Heidekrautflächen beweisen durch die unbedingte Vorherrschaft der Leitpflanze und die ganze Zusammensetzung der Begleitflora ihre Zugehörigkeit zur „Echten Heide“ im Sinne Graebners, und zwar zum Typus: „Calluna-Heide mit ausschließlicher Vorherrschaft von Calluna“ (Graebner 1901, p. 147 ff.). Allerdings bedeckt das Heidekraut die Flächen nährstoffarmen Sandes an der Schtschara in weit lockererem Bestande, als wir das

¹ Eine systematisch geordnete Aufzählung aller im Gebiete beobachteten Arten nebst deren Formen wird in den „Verhandlungen des Botan. Vereins der Prov. Brandenburg“, LXIII, 1921, veröffentlicht werden.

von den nordwestdeutschen Heidegebieten gewohnt sind. Wenn auch die Luftfeuchtigkeit des Poljesje in den Randgebieten sich so stark bemerkbar macht, daß die genannte Assoziation zu charakteristischer Ausbildung gelangen kann, so ist doch die Gegenwirkung der kontinentalen Lage deutlich zu spüren.

Die Lücken zwischen den *Calluna*-Stöcken sind teils von zahlreichen Flechten wie *Cladonia rangiferina*, *C. silvatica*, *C. gracilis* und von Moosen wie *Polytrichum piliferum*, *P. juniperinum*, *Rhacomitrium canescens*, teils von Teppichen aus *Scleranthus perennis*¹, *Herniaria glabra* var. *puberula* und besonders aus *Thymus serpyllum* und aus *Hieracium pilosella* L. ssp. *impexum* Zahn² bedeckt. Auch *Hypericum humifusum* und *Lycopodium clavatum* sind nicht selten. Von Gräsern fallen besonders *Corynephorus canescens* und *Festuca ovina* auf, etwas weniger *Agrostis vulgaris*. Dazu tritt *Carex leporina*. In kleinen Gruppen wächst *Veronica officinalis* und ebenso *Brunella vulgaris*. Ueberall eingestreut erheben sich *Hypericum perforatum*, *Jasione montana*, *Erigeron acer*, *Helichrysum arenarium*, *Achillea millefolium*, *Chrysanthemum leucanthemum*, *Centaurea jacea*, *Leontodon autumnalis*. Im Frühjahr erscheinen *Teesdalea nudicaulis* und *Draba verna* in Menge. Hier und dort stehen kümmerliche *Pinus silvestris*; recht zahlreich ist *Juniperus communis* vertreten. Letzterer tritt gelegentlich so stark hervor, daß man wohl von einer „Wacholder-Heide“ sprechen könnte, doch nur auf engbegrenzten Flächen.

2. Sandfeldgemeinschaft.

Oft, aber nicht immer, in Nachbarschaft der *Calluna*-Heide, gelegentlich auch inmitten großer Waldkomplexe, liegen große sandige Flächen, die offenbar zur Heidebildung neigen. *Calluna* tritt reichlich, aber nicht geschlossen auf. In der Hauptsache dürfte es der Mensch sein, der ausgesprochene Heidebildung verhindert. Vieles deutet darauf hin, daß es sich zum guten Teile um Flächen handelt, die früher längere oder kürzere Zeit unter Kultur standen, dann aber wieder aufgegeben wurden. Im Laufe der Jahre werden gewiß die meisten, das Ausbleiben störender Eingriffe vorausgesetzt, in *Calluna*-Heide übergehen.

Eine Gleichstellung mit den „Heidekrautlosen Sandfeldern“ Graebners (1901, p. 255 ff.), die ausgesprochenen Nährstoffmangel und intensive jährliche Austrocknung zur Voraussetzung haben, erscheint trotz vieler Ähnlichkeiten in der Vegetation nicht angebracht. Daß es sich im großen und ganzen um eine sekundäre Formation (Warming-Graebner, 1914—18, p. 348)

¹ Nomenklatur der Gefäßpflanzen nach Wünsche-Abromeit „Die Pflanzen Deutschlands“, 2. Aufl., 1916.

² Die Formen von *Hieracium* bestimmte K. H. Zahn-Karlsruhe.

handelt, bezeugt auch eine gewisse Instabilität in der Zusammensetzung der Pflanzenvereine. Tonangebende Arten sind neben *Calluna vulgaris*: *Pteridium aquilinum*, *Nardus stricta*, *Rumex acetosella*, *Trifolium strepens*, *Peucedanum oreoselinum*, *Thymus serpyllum* und besonders *Artemisia campestris*, doch nicht in gleichmäßiger Verteilung. Hier herrscht die eine, dort die andere vor. Dabei spielt, ähnlich wie bei nur gelegentlich brachliegendem Kulturland (siehe unten p. 56), die Beschaffenheit des benachbarten Geländes oft eine bestimmende Rolle. So dominiert auf den Sandfeldern in der Nähe von Calluna-Heiden *Calluna*, in der Nähe von Kiefernheiden *Pteridium*, in der Nähe von Buschstrüpfen *Peucedanum*, in der Nähe von Brachland *Trifolium strepens* usw. Ueberall häufig ist *Erigeron canadensis*, doch nie so stark hervortretend wie auf manchen Brachäckern. Bemerkenswert sind weiterhin **Allium oleraceum*¹, *Silene inflata* var. nov. **Tessendorffii*², *S. armeria*³ (häufig), *Dianthus deltoides*, *Astragalus arenarius* (häufig), *Coronilla varia*, *Viola canina* in der Form *ericetorum* (häufig), *Verbascum thapsus* und *V. phlomoides* (häufig) und besonders das mehrfach auf mehr kiesigem Boden auftretende **Epilobium collinum*. Im zeitigen Frühjahr sieht man allenthalben *Teesdalea nudicaulis*, *Draba verna* und *Stenophragma Thalianum*.

Von Flechten sind *Cladonia silvatica*, *C. gracilis*, *Peltigera rufescens*, von Moosen *Polytrichum piliferum*, *Racomitrium canescens* usw. zu nennen.

An Gefäßpflanzen wurden im ganzen festgestellt:

<i>Pteridium aquilinum</i> cop.	<i>S. armeria</i> cop.
<i>Phleum pratense</i> sp.	<i>Dianthus deltoides</i> sp.
<i>Agrostis vulgaris</i> cop.	<i>Cerastium triviale</i> cop.
<i>Corynephorus canescens</i> cop.	<i>Spergula arvensis</i> cop.
<i>Festuca ovina</i> cop.	<i>Herniaria glabra</i> var. <i>puberula</i> cop.
<i>Nardus stricta</i> cop.	<i>Scleranthus perennis</i> cop.
<i>Luzula campestris</i> cop.	<i>Teesdalea nudicaulis</i> cop.
<i>*Allium oleraceum</i> sp.	<i>Draba verna</i> cop.
<i>Rumex acetosella</i> cop.	<i>Stenophragma Thalianum</i> cop.
<i>Silene inflata</i> cop.	<i>Potentilla argentea</i> sp.

¹ Die durch einen vorgesetzten Stern gekennzeichneten Pflanzen sind „bestandes-eigene“ Arten (siehe p. 9 oben).

² *Silene inflata* Smith var. nov. *Tessendorffii* Abrom.: *Planta gracilis*, inflorescentia compacta subglomerata, foliis lineari-lanceolatis 18—22 mm longis, 2—3 mm latis, acuminatis; caulis ca. 40 cm longus; calyx 20— nervius obconicus subinflatus. — *Abromeit* in litt.

³ *S. armeria* tritt z. T. in Formen auf, die der *S. Berdaui* Zapalowicz (nach Graebner [Syn. Mitteleurop. Flora Bd. V. 2] Rasse von *S. armeria*) nahe stehen.

<i>Trifolium strepens</i> cop.	<i>Galium verum</i> cop.
<i>T. arvense</i> cop.	<i>Knautia arvensis</i> cop.
<i>Lotus corniculatus</i> sp.	<i>Campanula rotundifolia</i> sp.
<i>Astragalus arenarius</i> cop.	<i>C. patula</i> sp.
<i>Hypericum perforatum</i> cop.	<i>Jasione montana</i> cop.
<i>H. humifusum</i> cop.	<i>Erigeron acer</i> sp.
<i>Viola canina</i> f. <i>ericetorum</i> cop.	<i>E. canadensis</i> cop.
* <i>Epilobium collinum</i> sp.	<i>Filago arvensis</i> cop.
<i>Pimpinella saxifraga</i> cop.	<i>F. minima</i> cop.
<i>Peucedanum oreoselinum</i> cop.	<i>Antennaria dioica</i> cop.
<i>Calluna vulgaris</i> cop.	<i>Gnaphalium silvaticum</i> sp.
<i>Anchusa officinalis</i> sp.	<i>Helichrysum arenarium</i> cop.
<i>Myosotis arenaria</i> cop.	<i>Achillea millefolium</i> cop.
<i>Galeopsis ladanum</i> cop.	<i>Artemisia campestris</i> cop.
<i>Thymus chamaedrys</i> sp.	<i>Centaurea jacea</i> cop.
<i>T. serpyllum</i> cop.	<i>C. scabiosa</i> sp.
<i>Verbascum thapsus</i> sp.	<i>Hypochoeris radicata</i> cop.
<i>V. phlomoides</i> cop.	<i>Leontodon autumnalis</i> sp.
<i>Linaria vulgaris</i> sp.	<i>Hieracium pilosella</i> subsp. <i>impexum</i>
<i>Veronica Dillenii</i> sp.	<i>Zahn</i> cop.

An Stellen größerer Feuchtigkeit, wie in tief eingefahrenen Wegen usw. findet sich eine Gesellschaft überwiegend *Hapaxanther*: *Setaria viridis*, *S. glauca*, *Polygonum aviculare*, *P. tomentosum*, *Spergula arvensis*, *Herniaria glabra* var. *puberula*, *Trifolium repens*, *Hypericum humifusum*, *Galeopsis ladanum*, *Odontites verna*, *Filago arvensis*, *F. minima*, *Gnaphalium uliginosum*.

Gelegentlich eingeschleppt treten *Fagopyrum esculentum* und *Delphinium consolida* auf.

3. Kiefern-Heide.

Die *Calluna*-Heide mit ihren vereinzelt kümmerlichen *Pinus silvestris* geht nicht selten in die Kiefern-Heide mit *Pinus silvestris* in mittelhohen Exemplaren (in lockerem Verbands) über. Es besteht gewiß auch ein genetischer Zusammenhang zwischen diesen Heide-Typen, und zwar so, daß im natürlichen Geschehen die *Calluna*-Heide von der Waldheide abgelöst wird.

Die Kiefernheide des Schtschara-Gebietes stimmt mit keiner der von Graebner (1901) aus Norddeutschland aufgestellten „Facies“ dieser Gemeinschaft völlig überein. Vom eigentlichen Typus, wie er dort beschrieben wird (p. 228 ff.), trennt sie der Umstand, daß die *Calluna* zwar weitaus vorherrscht, aber keinen dichten Teppich bildet, sondern reichlich Platz für

zahlreiche andere Gewächse läßt. Unsere Assoziation steht etwa in der Mitte zwischen den Facies: „Kiefernheide mit Vorherrschen von *Juniperus communis*“ (p. 237 ff.) und „Kiefernheide mit Vorherrschen von Gräsern“ (p. 240 ff.).

Sehr bezeichnend ist das massenhafte Auftreten von dem Boden an-
geschmiegtten oder doch ganz niedrigen Gewächsen. Flechten: *Cladonia*
fimbriata, *C. rangiferina*, *C. silvatica*, *C. gracilis*; Moose: *Polytrichum pili-*
ferum, *P. juniperinum*, *Thuidium abietinum*, *Bryum caespiticium*, *Rhaco-*
mitrium canescens; Gefäßpflanzen: *Lycopodium clavatum*, *Gypsophila*
muralis, *Cerastium triviale*, *Herniaria glabra* var. *puberula*, *Scleranthus*
perennis, *Trifolium repens*, *Lotus corniculatus*, *Hypericum humifusum*, *Viola*
arenaria, *V. tricolor* (in der var. *arvensis*), *Arctostaphylus uva ursi* (nicht
überall), *Brunella vulgaris*, *Thymus serpyllum*, *Veronica officinalis*, *V. ser-*
pyllifolia, *V. Dillenii*, *Filago minima*, *Antennaria dioica*, *Hieracium*
pilosella subsp. *impexum* Zahn.

Sehr häufig sind daneben: *Pteridium aquilinum*, *Agrostis vulgaris*,
Festuca ovina, *Rumex acetosella*, *Trifolium strepens*, *T. arvense*, *Melampyrum*
pratense, *Jasione montana*, *Helichrysum arenarium* und mehr zerstreut: *Cal-*
amagrostis epigaeios, **Koeleria cristata* (in der subsp. *pyramidata*), *Luzula cam-*
pestris, *Silene inflata*, *S. armeria* (seltener), *Pulsatilla patens*, *Astragalus*
arenarius, *Hypericum perforatum*, *Pimpinella saxifraga*, *Verbascum nigrum*,
Plantago lanceolata, *Achillea millefolium*, *Hypochoeris radicata* u. a. m.

4. Kiefernwald.

Von der Kiefernheide unterscheidet sich der „Kiefernwald“ auf den
ersten Blick durch den höheren und kräftigeren Wuchs der Bäume. Stattliche
Stämme von etwa 25 m Höhe bilden den Durchschnitt. Dabei ist der
Pinus silvetris-Bestand nicht mehr ganz rein von anderen Bäumen. Von Laub-
hölzern treten in dem lichten Walde vereinzelt *Carpinus betulus*, *Pirus aucuparia*
und kräftige *Quercus robur*, etwas häufiger *Betula verrucosa*, selten *Populus*
tremula und *Betula pubescens* auf. *Picea excelsa* ist als ausgewachsener Baum
nur hier und da eingesprengt, weit mehr als Jungholz. Von Sträuchern ist
Corylus avellana gelegentlich zu sehen. *Juniperus communis* wächst reichlich
und in gut entwickelten Exemplaren.

Weit mehr als dieser mehr physiognomisch bedeutsame Unterschied
fällt gegenüber der Kiefernheide die Zusammensetzung der „Feldschicht“
(Hult 1881) ins Gewicht. Während in der Kiefernheide die Verteilung der
Feldschichtelemente in den Hauptzügen überall das gleiche Bild gewährt,
treten hier starke Verschiedenheiten auf. Teils herrscht *Calluna* vor, teils
Vaccinium myrtillus, teils eine Krautgenossenschaft, als deren charakteristisch-
ster Repräsentant vielleicht *Trifolium lupinaster* angesehen werden kann. Die

„Kiefernheide“ ist eine ökologische Einheit, eine Assoziation, der „Kiefernwald“ eine topographische Einheit, eine Biocoenose, die unter einer gemeinsamen Baumschicht mindestens drei Feldschicht-Assoziationen gut unterscheiden läßt.

Der „Heidekrautreiche Kiefernwald“ steht der Kiefernheide formationsbiologisch und sicherlich auch genetisch am nächsten. *Calluna vulgaris* ist Leitpflanze und hat etwa die gleichen Begleitpflanzen wie in der Kiefernheide. Dazu treten jedoch eine ganze Reihe weiterer Arten, die, ohne im einzelnen eine besondere Rolle zu spielen, das Gesamtbild zu einem erheblich reicheren gestalten. Siehe im übrigen unten die Gesamtliste der Arten des Kiefernwaldes. Besondere Erwähnung verdienen *Festuca rubra*, **Carex ericetorum*, *Silene inflata*, *Trifolium pratense*, *Pimpinella saxifraga*, das reichere Auftreten von *Arctostaphylos uva ursi* und besonders das für die Assoziation charakteristische, in kleinen Herden erscheinende *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps* (seltener in subsp. *chamaecyparissus*). Die „Bodenschicht“ weist *Cladonia* in reicher Entwicklung auf. Im ganzen kann man den Unterschied zwischen der Kiefernheide und dem Heidekrautreichen Kiefernwald kurz dahin aussprechen, daß jene eine Waldheide, dieser ein Heidewald ist. In den östlichen Gebieten mit mehr kontinentalem Klima ist ein solcher Rückzug der *Calluna* in den Wald eine häufige Erscheinung (siehe Graebner, 1901, p. 147).

Der „Heidelbeerreiche Kiefernwald“ hat *Vaccinium myrtillus* als ausgesprochene Leitpflanze. Die Heidelbeere überzieht oft viele Hektare mit einer so dichten Decke, daß nur wenige andere Pflanzen dazwischen aufkommen können. Recht charakteristisch ist das Auftreten von *Chimophila umbellata* in kleinen Herden, auch *Pirola secunda* und *P. minor* fallen auf. Von höherwüchsigen Stauden weiß sich am besten *Solidago virga aurea* durchzukämpfen. Stellenweise wird die Leitpflanze durch kleinere Rasen von *Vaccinium vitis idaea* ersetzt. Flechten und Moose können nicht mehr recht aufkommen. Den Anstoß zur Bildung der Vaccinieten im Kiefernwald (und auch in den Mischwäldern) gibt nach Graebner die Entstehung von Rohhumusdecken aus den verfilzten Resten von Nadeln, Wurzeln und Moosen (besonders *Dicranum* und *Polytrichum*). *Vaccinium myrtillus* und *V. vitis idaea* bevorzugen solche Stellen zur Ansiedelung und tragen späterhin auch ihrerseits erheblich zur Vermehrung des Rohhumus bei. Ähnliches gilt für die *Calluna*-Bestände in den Wäldern.

Der „Krautreiche Kiefernwald“ ist gegen die beiden anderen Assoziationen durch das starke Zurücktreten der Niedersträucher und durch einen auffälligen Reichtum an Arten, auch schönblumiger Arten, gekennzeichnet. Während dort einzelne Arten alle anderen zurückdrängten, haben wir hier ein reiches Gemisch physiognomisch mehr gleichwertiger Arten. Als

Leitpflanzen seien in erster Linie *Trifolium lupinaster* (vom hellen Rosa bis zum dunkeln Purpur variierend), dann *Arnica montana* und weiter *Astragalus arenarius*, *Geranium sanguineum*, *Campanula persicifolia*, *Solidago virga aurea*, *Chrysanthemum leucanthemum*, in zweiter Linie *Anthericum ramosum*, *Peucedanum oreoselinum*, *Melampyrum pratense*, *Knautia arvensis*, *Gnaphalium silvaticum*, *Hypochoeris maculata*, *Hieracum umbellatum* usw. genannt. „Bestandeseigene“ sind: **Polygonatum officinale* (häufig), *Potentilla tormentilla* var. **strictissima* (sehr häufig), **Astragalus danicus*, **Polygala comosa*, **Veronica spicata*, **Carlina vulgaris* und **Scorzonera humilis*. Eine große Zahl von Begleitpflanzen tritt hinzu. Moose, zum Teil auch Flechten sind reichlich vorhanden.

Im ganzen wurden im „Kiefernwald“ festgestellt: *Cladonia fimbriata*, *C. rangiferina*, *C. gracilis*, *C. silvatica*, *Stereocaulon tomentosum*. An Stämmen: *Parmelia physodes*, *P. sulcata*, *Evernia prunastri*, *Usnea hirta*, *Pertusaria globulifera*.

Hylocomium splendens, *H. Schreberi*, *Dicranum undulatum*, *Ceratodon purpureus*, *Polytrichum juniperinum*, *P. commune*, *P. formosum*, *P. piliferum*.

<i>Pteridium aquilinum</i> cop.	<i>Betula verrucosa</i> sp.
<i>Lycopodium annotinum</i> sp.	<i>B. pubescens</i> sp.
<i>L. clavatum</i> cop.	<i>Quercus robur</i> sp.
<i>L. complanatum</i> subsp. <i>anceps</i>	<i>Rumex acetosella</i> cop.
sp. gr. (seltener subsp. <i>chamaecyparissus</i>)	<i>Silene inflata</i> cop.
<i>Picea excelsa</i> sp.	<i>S. armeria</i> sp.
<i>Pinus silvestris</i> soc.	<i>Cerastium triviale</i> cop.
<i>Juniperus communis</i> cop.	<i>Scleranthus perennis</i> cop.
<i>Agrostis vulgaris</i> cop.	<i>Pulsatilla patens</i> cop.
<i>Calamagrostis epigeios</i> sp. gr.	<i>Pirus aucuparia</i> sp.
<i>C. arundinacea</i> sp.	<i>Rubus saxatilis</i> cop.
<i>Poa pratensis</i> sp.	<i>Fragaria vesca</i> cop.
<i>Festuca ovina</i> cop.	<i>Potentilla argentea</i> sp.
<i>F. rubra</i> cop.	<i>P. tormentilla</i> cop.
* <i>Carex ericetorum</i> sp.	<i>P. tormentilla</i> var. * <i>strictissima</i> cop.
<i>Luzula campestris</i> cop.	<i>Trifolium montanum</i> sp.
<i>Anthericum ramosum</i> sp.	<i>T. lupinaster</i> cop.
* <i>Polygonatum officinale</i> cop.	<i>T. pratense</i> sp.
<i>Convallaria majalis</i> sp.	<i>T. alpestre</i> sp.
<i>Populus tremula</i> sp.	<i>Lotus corniculatus</i> cop.
<i>Carpinus betulus</i> sp.	<i>Astragalus glycyphyllos</i> sp.
<i>Corylus avellana</i> sp.	<i>A. danicus</i> sp.
	<i>A. arenarius</i> cop.

- Coronilla varia* sp.
Vicia cracca sp.
Lathyrus montanus sp.
Geranium sanguineum cop.
Polygala vulgaris sp.
 **P. comosa* sp.
Hypericum perforatum cop.
H. humifusum cop.
Viola silvestris sp.
V. arenaria sp.
V. canina sp.
V. tricolor cop.
Epilobium angustifolium sp.
E. montanum sp.
Pimpinella saxifraga cop.
Selinum carvifolia sp.
Peucedanum oreoselinum cop.
Chimophila umbellata sp.
Pirola secunda sp.
P. minor sp.
Monotropa hipopitys var. *hirsuta* sp.
Arctostaphylos uva ursi sp. gr.
Vaccinium vitis idaea gr.
V. myrtillus gr. et p. p. soc.
Calluna vulgaris gr. et p. p. soc.
Ajuga genevensis sp.
Brunella vulgaris cop.
Calamintha acinos sp.
Thymus serpyllum cop.
Verbascum nigrum sp.
 **Veronica spicata* sp.
V. chamaedrys cop.
V. officinalis cop.
- V. serpyllifolia* sp.
Melampyrum pratense cop.
Euphrasia stricta sp. gr.
Galium boreale sp.
Knautia arvensis cop.
Campanula rotundifolia sp.
C. persicifolia cop.
Jasione montana cop.
Solidago virga aurea cop.
Erigeron acer sp.
Filago minima cop.
Antennaria dioica cop.
Gnaphalium silvaticum cop.
Helichrysum arenarium cop.
Achillea millefolium sp.
Chrysanthemum leucanthemum cop.
Arnica montana cop.
Senecio silvaticus sp.
S. jacobaea sp.
 **Carlina vulgaris* sp.
Cirsium lanceolatum subsp. *silvaticum* sp.
Centaurea jacea sp.
Hypochoeris radicata cop.
H. maculata sp.
 **Scorzonera humilis* sp.
Lactuca muralis sp.
Hieracium pilosella subsp. *impexum*
 Zahn cop.
H. cymosum subsp. *cymigerum*
 Rchb. sp.
H. umbellatum cop.

An Wegen finden sich außerdem noch: *Poa annua*, *Stellaria media*, *Trifolium repens*, *Plantago lanceolata*, *Artemisia absinthium*. Auf frisch verletztem Boden neben zahlreichen *Epilobium angustifolium* und *Senecio silvaticus* viel *Galeopsis ladanum*.

Hilbert (1917) gibt vom Rande des Kiefernwaldes *Dianthus plumarius* L. an, worunter er wohl eine Form des *D. arenarius* L. versteht.

5. Kiefern-Mischwald.

Vom „Kiefernwald“ führt eine Reihe von Uebergängen zu einem Mischwalde hin, der *Pinus silvestris* immer noch als dominierenden Baum aufweist, daneben aber zahlreiche Laubhölzer, vor allem *Carpinus betulus*, und, in stattlichen Exemplaren eingesprengt, auch *Picea excelsa*. Solche „Kiefern-mischwälder“ zeigt besonders der Norden des Gebietes in großer Ausdehnung. Der Grundwasserstand ist günstiger als bei der vorigen Biocoenose. Die Humusbildung ist auffallend gering. Es gilt dafür etwa dasselbe, was Schottler (1919, p. 332) für die Laubwaldböden von Bialowies sagt, daß nämlich unter einer überraschend dünnen Streudecke, die meist nur aus dem vorjährigen Laub besteht, fast stets Sand liegt, der meist nur oberflächlich schwach humos ist. Eine Vermengung mit Humus bis zu 4 und 5 cm tief, wie sie dort gelegentlich festgestellt wurde, habe ich nicht beobachtet.

Nadel- und Laubhölzer halten sich meist etwa die Wage. Unter den Laubbäumen folgt der Hainbuche an Zahl die Birke, meist *Betula verrucosa* (gelegentlich von einzelnen *Viscum album*-Büschen besetzt); an feuchteren Stellen auch wohl *Betula pubescens*. Weiter ist *Acer platanoides* stark vertreten. *Quercus robur* ist überall eingesprengt und bildet an Waldrändern öfter kleinere Bestände. *Populus tremula* erscheint in einzelnen hohen Exemplaren. Nicht selten ist auch *Pirus aucuparia*, und zuweilen trifft man **P. malus subsp. silvestris* S. F. Gray an. *Fraxinus excelsior* ist ganz vereinzelt. Die durchschnittliche Höhe der Bäume mag etwa 25 m betragen. Am höchsten werden Fichten, Espen, Eichen; es folgen Kiefer, Birke, Ahorn; etwas niedriger bleibt die Hainbuche.

Der Baumbestand ist ein recht lockerer, wozu der Umstand beiträgt, daß zahlreiche alte, weit ausladende Baumriesen eingestreut sind. Dennoch kommt das Unterholz nur mäßig zur Entwicklung. Jungholz sieht man wenig, mit Ausnahme von *Picea excelsa*, die im Vordringen begriffen zu sein scheint. Auch die Sträucher spielen nur eine bescheidene Rolle. *Corylus avellana* ist ziemlich häufig und gut entwickelt, ebenso *Juniperus communis*. *Frangula alnus* bleibt meist klein und dürrig. Hin und wieder finden sich *Daphne mezereum*, *Evonymus verrucosa* und weniger *E. europaea*, *Viburnum opulus*, gelegentlich auch *Salix caprea*.

Die Feldschicht zeigt gegenüber der des „Kiefernwaldes“ eine weitere Steigerung der Artenzahl, ist aber in den Hauptzügen ganz ähnlich wie jene aufgebaut. Wir finden wieder in manchen Bezirken *Calluna*, in anderen *Vaccinium myrtillus* als Leitpflanze; den Hauptteil bedeckt jedoch ein blumenreiches, saftiges Gemisch von Krautpflanzen. Flechten spielen durchweg eine geringe Rolle; bedeutsamer sind Moose; Farne sind reichlich vorhanden.

Im „Heidekrautreichen Kiefern-mischwald“ überwiegen in der Baumschicht die Kiefern stärker als in den anderen Teilen; *Betula verrucosa* tritt ebenfalls mehr hervor; desgleichen in der Strauchschicht *Juniperus communis*. *Calluna* bildet keinerlei geschlossene Decken mehr und wird häufig von Gräsern und Kräutern überwuchert. Sie ist nicht mehr Herrscherin, sie ist hier durchaus ein Vasall, der sich gegen den Einfluß des kontinentalen Klimas unter den Schutz des Waldes gestellt hat (Graebner 1901, p. 147—148). In der Begleitflora zeigen sich starke Anklänge an die entsprechende Assoziation des Trockenen Kiefernwaldes. *Arctostaphylos* fehlt allerdings. *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps* ist wieder Charakterpflanze. Die auffallend häufige *Triodia decumbens*, weiter *Platanthera bifolia*, *Pulsatilla patens*, *Trifolium lupinaster* und das weniger häufige *T. spadiceum*, *Senecio silvaticus* sind u. a. bezeichnende Begleitpflanzen. Im ganzen seien aus der Begleitflora des Heidekrautes hervorgehoben:

<i>Pteridium aquilinum</i>	<i>Geranium sanguineum</i>
<i>Lycopodium clavatum</i>	<i>Hypericum perforatum</i>
<i>L. complanatum</i> subsp. <i>anceps</i>	<i>Viola canina</i>
<i>Agrostis vulgaris</i>	<i>Pimpinella saxifraga</i>
<i>Holcus lanatus</i>	<i>Peucedanum oreoselinum</i>
<i>Triodia decumbens</i>	<i>Monotropa hypopitys</i> var. <i>hirsuta</i>
<i>Poa pratensis</i>	<i>Ajuga genevensis</i>
<i>Carex leporina</i>	<i>Brunella vulgaris</i>
<i>Luzula campestris</i>	<i>Thymus serpyllum</i>
<i>Anthericum ramosum</i>	<i>Veronica chamaedrys</i>
<i>Platanthera bifolia</i>	<i>Melampyrum pratense</i>
<i>Pulsatilla patens</i>	<i>Knautia arvensis</i>
<i>Rubus saxatilis</i>	<i>Campanula persicifolia</i>
<i>Fragaria vesca</i>	<i>Solidago virga aurea</i>
<i>Potentilla tormentilla</i>	<i>Achillea millefolium</i>
<i>Trifolium spadiceum</i>	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>
<i>T. lupinaster</i>	<i>Senecio silvaticus</i>
<i>Lotus corniculatus</i>	<i>Hypochoeris radicata</i>
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	<i>H. maculata</i>
<i>A. arenarius</i>	<i>Hieracium pilosella</i> subsp. <i>impexum</i>
<i>Lathyrus pratensis</i>	Zahn
<i>L. montanus</i>	<i>H. umbellatum</i>

Im „Heidelbeerreichen Kiefern-mischwald“ bildet *Vaccinium myrtillus* nicht ganz so dichte Teppiche wie in dem oben geschilderten Gegenstück. Auch übernimmt *V. vitis idaea* die Stellvertretung

auf weitere Strecken. Wieder sind die Pirolaceen sehr bezeichnend für die Assoziation, besonders *Chimophila umbellata* und *Pirola secunda*, daneben *P. rotundifolia* und *P. minor* und seltener **P. media*. Weiter seien *Potentilla tormentilla*, *Succisa pratensis*, *Campanula persicifolia*, *Solidago virga aurea*, *Chrysanthemum leucanthemum* und *Arnica montana* genannt, zu denen noch zahlreiche andere der unten in der Gesamtliste für den Kiefern-mischwald zusammengestellten Arten treten.

Der „Krautreiche Kiefern-mischwald“ erinnert in vielen Stücken an einen mitteldeutschen Laubwald. Die Uebereinstimmung in den Arten ist auf den ersten Blick eine auffallend große, wie man sie so weit im Osten im allgemeinen nicht mehr erwartet. Doch ergeben sich bei genauerer Durchmusterung manche recht gewichtige Unterschiede gegenüber dem Westen, nicht nur in der Liste, sondern ganz besonders auch in der Verteilung der Arten. Schon im Frühjahr entwickelt sich hier ein reicher Flor. Als erste schmücken Scharen von *Anemone nemorosa* und *Hepatica nobilis* unter Anführung von blütenreichen *Daphne mezereum*-Stöcken den Waldboden. Bald folgen *Pulmonaria officinalis*, *Luzula pilosa* und die seltenere **Corydalis solida*. Es schließen sich *Majanthemum bifolium*, *Ranunculus auricomus*, *Lathyrus montanus*, *L. vernus*, *Viola silvestris* und *V. Riviniana* und hier und da *Convallaria majalis* an. Ein mehr verstecktes Dasein führen *Asarum europaeum* und am Fuße der Laubhölzer *Lathraea squamaria*. Diese ganze Frühjahrsgemeinschaft ist besonders dort gut entwickelt, wo die Laubbäume das Uebergewicht haben. Hier machen sich bald auch *Asperula odorata* in großen Herden und ebenso *Stellaria holostea* breit; seltener zeigen sich *Ranunculus lanuginosus*, *Dentaria bulbifera*, Büsche von **Galium verum* und nur gelegentlich **Lilium martagon*. Später fällt durch besonders reiche vegetative Entwicklung *Lamium galeobdolon* auf. Von Gräsern sind bedeutsam: **Hierochloa australis*, *Milium effusum*, *Melica nutans*, *Calamagrostis arundinacea*, denen sich *Carex pallescens*, *C. silvatica* und besonders *C. digitata*, seltener *C. montana* zugesellen. *Luzula campestris* wird öfter von *L. sudetica* prol. *pallescens* vertreten. *Neottia nidus avis* ist keine seltene Erscheinung, desgleichen *Cerastium triviale* var. *nemorale*, *Moehringia trinervia*, **Aquilegia vulgaris*, **Sanicula europaea* und *Aegopodium podagraria*. Zwischen den Baumwurzeln im Moose wächst reichlich *Oxalis acetosella*. Schattige, moosreiche Stellen lieben auch *Aspidium dryopteris* (vorzüglich auf modernden Stämmen), *A. spinulosum*, *Equisetum silvaticum* und das seltenere *E. pratense*. Solche Stellen liegen häufig im Schutze vielverzweigter, tiefkroniger *Carpinus*; nicht selten auch dort, wo sich junge und alte *Picea* dichter zusammendrängen. Hier finden sich einige Besonderheiten: häufig *Goodyera repens*, gelegentlich **Linnaea borealis* und *Gymnadenia cucullata*. *Trientalis europaea* ist hier stets

reichlich zu sehen. Wo die Bäume lichter wachsen und *Pinus* vorherrscht, treten andere Arten in den Vordergrund: **Thesium ebracteatum*, *Viscaria vulgaris*, **Cerastium glomeratum* (gern auf Wegen), *Astragalus glycyphyllos*, **Vicia cassubica*, *Lathyrus pratensis*, *Geranium silvaticum*, *G. sanguineum*, *Epilobium montanum*, **Laserpitium prutenicum*, *Melampyrum pratense*, *Galium Schultesii*, **Campanula cervicaria*, *C. persicifolia*, **C. trachelium* und eine Reihe von Kompositen, wie *Solidago virga aurea*, *Chrysanthemum leucanthemum*, *Arnica montana*, *Serratula tinctoria*, **Centaurea phrygia*, *Hypochoeris maculata*, **Crepis praemorsa*, *Hieracium murorum* subsp. *silvularum* Jord. und *H. umbellatum*. *Lycopodium annotinum* überzieht ansehnliche Flächen; hier und dort kriecht *Rubus saxatilis* und zur Höhe klettern *Vicia silvatica* und **Lathyrus silvester*. Für die krautreichen Teile der Biocoenose ist *Melampyrum nemorosum* recht bezeichnend, das oft große Flecken geschlossen bedeckt.

Auf Lichtungen im Kiefern-mischwalde, wie sie Windbruch, Waldbrand usw. erzeugen, auf Schneisen, an den Rändern des Waldes trifft man eine buntgemischte Gesellschaft an, der mit Ausnahme der ausgesprochenen Schattenpflanzen fast alle Elemente der Waldbodenflora angehören; doch ist die Rollenverteilung infolge des erhöhten Lichtgenusses eine erheblich andere. So treten hier in den Vordergrund, während sie sich im Walde mit einem bescheidenen Platze begnügen: *Lychnis flos cuculi*, **Ranunculus polyanthemus*, *Alchemilla vulgaris*, *Galium boreale*; eine Reihe von Leguminosen: *Trifolium strepens*, *T. spadiceum*, *T. montanum*, *T. alpestre*, **T. medium*, *Coronilla varia*, *Vicia cracca* und **Lathyrus niger*; weiter *Polygala vulgaris*, *Hypericum quadrangulum*, *Angelica silvestris*, *Selinum carvifolia*, *Erythraea centaurium*; eine Anzahl schöner Labiaten: **Brunella grandiflora*, *Stachys betonica*, **Calamintha clinopodium* und **Origanum vulgare*; *Euphrasia stricta*, *Alectorolophus major* usw. Recht stark sind die Gräser vertreten: *Anthoxanthum odoratum*, *Phleum pratense*, *Agrostis vulgaris*, *Holcus lanatus*, *H. mollis*, *Triodia decumbens*, *Briza media*, *Dactylis glomerata*, *Poa pratensis*, *Festuca ovina*, **Brachypodium pinnatum* u. a. m., von Sauergräsern besonders *Carex pallescens*. Bedeutsam ist das Vorkommen von **Epilobium Lamyi*, von *Euphrasia curta* und von einer Reihe von *Hieracium*-Formen, besonders an den Waldrändern: **H. flagellare* subsp. *flagellare* Willd. und subsp. *cernuiforme* N. P., *H. auricula* subsp. *lituanicum* N. P., *H. floribundum*, *H. florentinum* subsp. *aquilonare* (N. P.) Zahn, *H. pratense* subsp. *silvicolum* Fr., *H. cymosum* subsp. *cymigerum* Rchb. Erwähnt sei auch der im Gebiet nur hier gefundene **Leontodon hispidus*. Ueberhaupt ist die Zahl — fast 20 — der nur im lichten Kiefern-mischwalde und auf seinen Blößen beobachteten Arten eine auffällig große.

Insgesamt können als zur Pflanzengemeinschaft des Kiefern-mischwaldes gehörig etwa folgende Arten gezählt werden:

Moose: *Hylocomium Schreberi*, *H. splendens*, *Dicranum undulatum*, *Hypnum cupressiforme*, *Polytrichum juniperinum*, *P. commune*, *P. formosum*. Die Flechten (an den Stämmen) sind etwa die gleichen, wie sie weiter unten beim Fichtenmischwald angegeben werden.

- | | |
|--|---|
| <i>Aspidium dryopteris</i> sp. gr. | <i>Platanthera bifolia</i> cop. |
| <i>A. spinulosum</i> cop. | <i>Neottia nidus avis</i> sp. |
| <i>Pteridium aquilinum</i> cop. | <i>Goodyera repens</i> sp. |
| <i>Equisetum silvaticum</i> sp. gr. | <i>Populus tremula</i> cop. |
| <i>E. pratense</i> sp. | <i>Salix caprea</i> sp. |
| <i>Lycopodium annotinum</i> cop. gr. | <i>Carpinus betulus</i> cop., p. p. soc. |
| <i>L. clavatum</i> cop. | <i>Corylus avellana</i> cop. |
| <i>L. complanatum</i> subsp. <i>anceps</i> sp. | <i>Betula verrucosa</i> cop. |
| <i>Picea excelsa</i> cop. | <i>B. pubescens</i> cop. |
| <i>Pinus silvestris</i> soc. p. p. | <i>Quercus robur</i> cop. |
| <i>Juniperus communis</i> cop. | <i>Viscum album</i> (auf <i>Betula</i> |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> cop. | <i>verrucosa</i>) sp. |
| * <i>Hierochloa australis</i> sp. | * <i>Thesium ebracteatum</i> sp. |
| <i>Milium effusum</i> sp. | <i>Asarum europaeum</i> sp. |
| <i>Phleum pratense</i> sp. | <i>Viscaria vulgaris</i> sp. |
| <i>Agrostis vulgaris</i> cop. | <i>Lychnis flos cuculi</i> cop. |
| <i>A. alba</i> sp. | <i>Stellaria holostea</i> cop. |
| <i>Calamagrostis arundinacea</i> cop. | <i>S. graminea</i> sp. |
| <i>Holcus lanatus</i> cop. | * <i>Cerastium glomeratum</i> sp. |
| <i>H. mollis</i> sp. | <i>C. triviale</i> sp. |
| <i>Triodia decumbens</i> cop. | <i>C. triviale</i> var. <i>nemorale</i> sp. |
| <i>Melia nutans</i> sp. | <i>Moehringia trinervia</i> sp. |
| <i>Briza media</i> sp. | * <i>Aquilegia vulgaris</i> sp. |
| <i>Dactylis glomerata</i> sp. | <i>Anemone nemorosa</i> cop. |
| <i>Poa pratensis</i> cop. | <i>Hepatica nobilis</i> cop. |
| <i>Festuca ovina</i> sp. | <i>Pulsatilla patens</i> sp. |
| * <i>Brachypodium pinnatum</i> sp. | * <i>Ranunculus polyanthemus</i> sp. |
| <i>Carex leporina</i> cop. | <i>R. auricomus</i> sp. |
| <i>C. pallescens</i> cop. | <i>R. acer</i> sp. |
| <i>C. digitata</i> cop. | <i>R. lanuginosus</i> sp. |
| <i>C. montana</i> sp. | * <i>Corydalis solida</i> sp. |
| <i>C. silvatica</i> sp. | <i>Cardamine flexuosa</i> With. sp. |
| <i>Luzula pilosa</i> cop. | <i>Dentaria bulbifera</i> sp. |
| <i>L. campestris</i> cop. | * <i>Pirus malus</i> subsp. <i>silvestris</i> |
| <i>L. sudetica</i> prol. <i>pallescens</i> sp. | <i>S. F. Gray</i> sp. |
| <i>Anthericum ramosum</i> sp. | <i>P. aucuparia</i> cop. |
| * <i>Lilium martagon</i> sp. | <i>Rubus saxatilis</i> cop. |
| <i>Majanthemum bifolium</i> cop. | <i>Fragaria vesca</i> cop. |
| <i>Convallaria majalis</i> sp. | <i>Potentilla tormentilla</i> cop. |
| <i>Orchis maculatus</i> sp. | <i>Alchemilla vulgaris</i> sp. |
| <i>Gymnadenia cucullata</i> sp. | <i>Trifolium strepens</i> sp. |

- T. spadiceum* sp.
T. montanum sp.
T. lupinaster sp.
T. alpestre sp.
 **T. medium* sp.
Lotus corniculatus sp.
Astragalus glycyphyllos cop.
A. arenarius sp.
Coronilla varia sp.
Vicia sepium sp.
V. silvatica sp.
 **V. cassubica* sp.
V. cracca sp.
Lathyrus pratensis cop.
 **L. silvester* sp.
L. montanus cop.
L. vernus cop.
 **L. niger* sp.
Geranium silvaticum cop.
G. sanguineum cop.
Oxalis acetosella cop.
Polygala vulgaris cop.
Evonymus europaea sp.
E. verrucosa sp.
Acer platanoides cop.
Frangula alnus cop.
Hypericum perforatum sp.
H. quadrangulum sp.
Viola silvestris cop.
V. Riviniana sp.
V. canina cop.
Daphne mezereum cop.
Epilobium montanum cop.
 **E. Lamyi* sp.
 **Sanicula europaea* sp.
Aegopodium podagraria sp.
Pimpinella saxifraga sp.
Angelica silvestris sp.
Selinum carvifolia sp.
Peucedanum oreoselinum sp.
 **Laserpitium prutenicum* sp.
Chimophila umbellata sp.
Pirola secunda sp.
P. rotundifolia sp.
 **P. media* sp.
P. minor sp.
Monotropa hypopitys var. *hirsuta* sp.
Vaccinium vitis idaea cop. gr.
- V. myrtillus* cop. gr.
Calluna vulgaris cop. gr.
Trientalis europaea cop.
Fraxinus excelsior sp.
Erythraea centaureum sp.
Pulmonaria officinalis sp.
Ajuga reptans sp.
A. genevensis cop.
Brunella vulgaris cop.
 **B. grandiflora* sp.
Galeopsis tetrahit sp.
Lamium galeobdolon gr.
Stachys betonica cop.
 **Calamintha clinopodium* sp.
 **Origanum vulgare* sp.
Thymus chamaedrys sp.
T. serpyllum cop.
Veronica chamaedrys cop.
V. officinalis cop.
V. serpyllifolia sp.
Melampyrum nemorosum gr.
M. pratense cop.
Euphrasia stricta sp.
E. curta sp.
Alectorolophus major sp.
Lathraea squamaria sp.
Asperula odorata cop.
 **Galium verum* sp.
G. boreale sp.
G. Schultesii sp.
Viburnum opulus sp.
 **Linnaea borealis* sp.
Knautia arvensis sp.
Succisa pratensis cop.
 **Campanula cervicaria* sp.
C. glomerata sp.
C. rotundifolia sp.
C. patula sp.
C. persicifolia cop.
 **C. trachelium* sp.
Solidago virga aurea cop.
Antennaria dioica sp.
Gnaphalium silvaticum cop.
Achillea millefolium sp.
Chrysanthemum leucanthemum cop.
Arnica montana cop.
Senecio silvaticus sp.

Cirsium lanceolatum subsp.
 silvaticum sp.
Serratula tinctoria sp.
Centaurea jacea sp.
 **C. phrygia* sp.
Hypochoeris radicata sp.
H. maculata sp.
Leontodon autumnalis sp.
 **L. hispidus* sp.
Lactuca muralis sp.
 **Crepis praemorsa* sp.
Hieracium pilosella subsp. *impexum*
 Zahn sp.

**H. flagellare* (subsp. *flagellare* Willd.
 und subsp. *cernuiforme* N. P.) sp.
H. auricula subsp. *littuanicum*
 N. P. sp.
H. floribundum sp.
H. florentinum subsp. *aquilonare*
 (N. P.) Zahn sp.
H. pratense subsp. *silvicolum* Fr. sp.
H. cymosum subsp. *cymigerum*
 Rchb. sp.
H. murorum subsp. *silvularum*
 Jord. cop.
H. umbellatum sp.

Auf und an den durch das Waldgebiet führenden Wegen finden sich an dem Mischwalde sonst mehr oder weniger fremden Arten:

Poa annua
Carex hirta
Rumex acetosella
Polygonum aviculare
Silene inflata
Melandryum album
Gypsophila muralis
Spergula arvensis
Spergularia rubra
Scleranthus perennis
Potentilla argentea
P. norvegica (häufig)
P. anserina
Melilotus officinalis
Trifolium repens
T. pratense
Hypericum humifusum

Viola tricolor
Torilus anthriscus
Verbascum nigrum
Linaria vulgaris
Plantago major
P. media
P. lanceolata
Galium mollugo
Erigeron acer
Filago arvensis
F. minima
Gnaphalium uliginosum
Anthemis tinctoria
Senecio jacobaea
Centaurea jacea var. *tomentosa*
Taraxacum officinale (selten)
Crepis tectorum

Am Rande eines Kiefern-mischwaldes fand sich ein Bestand von *Sarothamnus scoparius*. Doch ist diese Pflanze wohl sicher nicht einheimisch im Gebiete.

6. Buschtrift

Durch Rodung und Weidetrieb wird in der Nähe von Siedelungen der Kiefern-mischwald in eine gras- und kräuterreiche Weide-Trift übergeführt, auf der sich Holzpflanzen nur in Buschform zeigen. Vor allem sind es *Quercus robur*-Büsche, die gut entwickelt zusammen mit Hochsträuchern von *Populus tremula* und *Betula pubescens* dem Vegetationsbilde den Charakter verleihen. *Pinus silvestris* und *Picea excelsa* sind in Verbißformen eingestreut. *Juniperus communis* ist häufig, aber nicht tonangebend, ebenso *Frangula alnus*, hier ein

ansehnlicher Strauch, während die Exemplare in den Mischwäldern meist auffallend kümmerlich sind.

Es mag diese Biocoenose, die kein natürliches Produkt, sondern nur eine sekundäre unter dem Einfluß des Menschen entstandene und noch stehende Lebensgemeinschaft darstellt, im Gegensatz zu unter dem gleichen Einfluß, aber aus anderen Bestandesformen entwickelten Triften als „Buschtrift“ bezeichnet werden.

Der Unterwuchs ist ein recht freudiger. An trockeneren Stellen viel *Rumex acetosella*, *Scleranthus perennis*, *Astragalus arenarius*, *Peucedanum oreoselinum*, *Calluna vulgaris*, *Jasione montana*; in etwas feuchteren Vertiefungen *Rumex acetosa*, *Stellaria graminea*, *Selinum carvifolia*, *Gentiana pneumonanthe*. Von Gräsern: *Anthoxanthum odoratum*, *Agrostis vulgaris*, *Holcus mollis*, *Triodia decumbens*, *Briza media*, *Festuca ovina* u. a. m. Viel Farbe bringen in das Bild: die in der Buschtrift recht häufige *Silene armeria*, weiter *Dianthus deltoides*, *Potentilla tormentilla*, *Trifolium strepens*, *T. spadicum*, *Geranium sanguineum*, *Hypericum quadrangulum*, *Stachys betonica*, *Thymus chamaedrys* und *T. serpyllum*, *Melampyrum nemorosum* und *M. pratense*, *Chrysanthemum leucanthemum*, *Arnica montana*. Auch zwei Orchideen finden sich: *Orchis maculatus* und das nur hier festgestellte **Coeloglossum viride*. Neben *Euphrasia stricta* tritt auch *E. curta* auf.

Im ganzen gehören in dies Vegetationsbild:

Ceratodon purpureus, *Hylocomium Schreberi*;

<i>Pteridium aquilinum</i> cop.	<i>Rumex acetosella</i> cop.
<i>Picea excelsa</i> (klein) sp.	<i>R. acetosa</i> sp.
<i>Pinus silvestris</i> (klein) sp.	<i>Silene inflata</i> cop.
<i>Juniperus communis</i> cop.	<i>S. armeria</i> cop.
<i>Anthoxanthum odoratum</i> cop.	<i>Dianthus deltoides</i> cop.
<i>Phleum pratense</i> sp.	<i>Stellaria graminea</i> cop.
<i>Agrostis vulgaris</i> cop.	<i>Cerastium triviale</i> sp.
<i>Holcus mollis</i> cop.	<i>Scleranthus perennis</i> cop.
<i>Triodia decumbens</i> cop.	<i>Potentilla argentea</i> sp.
<i>Molinia coerulea</i> sp.	<i>P. tormentilla</i> cop.
<i>Briza media</i> cop.	<i>Trifolium strepens</i> cop.
<i>Festuca ovina</i> cop.	<i>T. spadicum</i> cop.
<i>F. rubra</i> sp.	<i>T. repens</i> sp.
<i>Carex leporina</i> sp.	<i>T. pratense</i> sp.
<i>C. pallescens</i> cop.	<i>Astragalus arenarius</i> sp.
<i>Luzula campestris</i> cop.	<i>Coronilla varia</i> sp.
<i>Orchis maculatus</i> sp.	<i>Geranium sanguineum</i> cop.
* <i>Coeloglossum viride</i> sp.	<i>Polygala vulgaris</i> sp.
<i>Populus tremula</i> (klein) cop.	<i>Frangula alnus</i> cop.
<i>Betula pubescens</i> (klein) cop.	<i>Hypericum perforatum</i> sp.
<i>Quercus robur</i> (klein) cop.	<i>H. quadrangulum</i> cop.

Viola canina sp.
Pimpinella saxifraga cop.
Selinum carvifolia cop.
Peucedanum oreoselinum sp.
Calluna vulgaris cop.
Gentiana pneumonanthe sp.
Brunella vulgaris cop.
Stachys betonica cop.
Thymus chamaedrys cop.
T. serpyllum cop.
Melampyrum nemorosum cop.
M. pratense cop.
Euphrasia stricta sp.
E. curta sp.
Plantago lanceolata sp.
Campanula glomerata sp.

C. patula sp.
Jasione montana cop.
Achillea millefolium sp.
Chrysanthemum leucanthemum cop.
Arnica montana sp.
Centaurea jacea sp.
Hypochoeris radicata sp.
Leontodon autumnalis sp.
Hieracium pilosella subsp. *impexum*
 Zahn cop.
H. auriculoides Láng = *H. pan-*
 nonicum N. P. sol.
H. murorum subsp. *silvularum*
 Jord. sp.
H. umbellatum cop.

Anhangsweise mögen hier noch einige Pflanzen genannt werden, die ich in einer solchen Buschtrift nur einmal und zwar auf einem stark lehmhaltigen Boden an einem sanft abfallenden Hange im Verein mit den oben genannten fand: *Viscaria vulgaris*, *Sedum maximum*, *Lathyrus pratensis*, *Geranium silvaticum*, *Brunella vulgaris* flore albo (sehr viel), *Verbascum phlomoides*, *Chrysanthemum vulgare*, *Senecio jacobaea*, *Hieracium floribundum*.

7. Fichten-Mischwald.

Wo der Grundwasserspiegel der Oberfläche so nahe kommt, daß selbst in trockenen Perioden schon wenige Spatenstiche in das Feuchte führen, entsteht ein Mischwald von eindrucksvoller Urwüchsigkeit, ein Waldbild, wie es sich in Deutschland unseren Augen kaum darbietet. Ein Hainbuchen-Fichten-Wald mit Annäherung an die Gepflogenheiten eines Erlenbruches. Zu Zeiten stärkerer Niederschläge tritt das Wasser zutage und überschwemmt den Waldboden. Dann ragen nur die Sockel der Bäume, von zahlreichen, nach allen Richtungen radiär ausstrahlenden, oft brettartig geformten und hochkant gestellten Wurzeln gebildet, hervor. Zahlreiche vom Winde gefällte Stämme in allen Stadien der Vermorschung sind dem Wanderer weit eher Hindernisse als Brücken. Da ist denn eine Durchquerung ein schwieriges Unterfangen. Selbst in der trockenen Zeit ist durch diesen Wald schwer hindurchzukommen. Die Bäume stehen dichter als im Kiefern-mischwald, wozu hauptsächlich der Reichtum an *Picea* beiträgt. Unterholz ist weniger von Sträuchern als vom Nachwuchs der Bäume in nicht sehr starkem Maße ausgebildet. Um so üppiger schießt die Bodenflora ins Kraut. An vielen Stellen macht sich eine Neigung zur Versumpfung bemerkbar. Beim Umstürzen der Bäume heben die flach streichenden Wurzeln hohe Erdwände heraus, die mancherorts in großer Zahl kulissenartig den Wald verstellen, ihre frühere Stätte einem Tümpel überlassend.

Mit feuchteren Partien wechseln trockenere ab. Trotz der üppigen Vegetation ist die Humusbildung ähnlich wie im Kiefern-mischwald auffällig gering. Schon in etwa 10—20 cm Tiefe findet man den reinfarbigem, etwas lehmhaltigen Sand unter dem dunkleren Waldboden.

Der Hauptbaum ist *Picea excelsa*. Schöne, schlankwüchsige Stämme, mit meist in etwa drei- bis vierfacher Manneshöhe beginnender Krone, erreichen durchschnittlich eine Höhe von etwa 25—30 m. Doch findet man vereinzelt auch weit höhere, außerordentlich kräftige Exemplare. *Carpinus betulus* kommt der Fichte an Zahl zunächst, erreicht die Partnerin jedoch weder an Höhe noch an Dicke. Die Verästelung ist reich und beginnt meist schon in geringer Höhe, ladet aber nicht sehr weit aus. In großer Regelmäßigkeit ist *Populus tremula* eingestreut. Ihre mächtigen, schlank säulenförmigen Stämme erheben die relativ kleine Krone bis 35 m in die Luft. An einigen wenigen Stellen fand ich sie mit *Viscum album* besetzt. Sie stellt unter den dem Sturme zum Opfer fallenden Waldriesen einen besonders hohen Prozentsatz. *Alnus glutinosa* ist häufig eingemischt, hochkronig, höher als Hainbuche, aber niedriger als Fichte. Mit der Erle stimmt an Höhe die reichlich vertretene *Betula pubescens* fast überein.

Weit weniger häufig als die vorgenannten, doch in allen Teilen des Fichtenmischwaldes, finden sich *Quercus robur*, *Acer platanoides*, *Fraxinus excelsior* und besonders *Pinus silvestris*. Die Eiche zeigt das bekannte knorrige, kräftige Baumbild. Der Ahorn bleibt meist schlank und ähnelt bei weniger reichlicher und höher über dem Erdboden beginnender Verästelung im Wuchse der Hainbuche. Esche und Kiefer sind hochkronig. Besonders die Esche erreicht bedeutende Höhe; sie bevorzugt die feuchteren Partien. Die Kiefer ist für die etwas trockneren Teile charakteristisch und hier häufiger als sonst im Fichtenmischwald vertreten. An den Waldrändern ist *Pirus aucuparia* eine häufige Erscheinung; seltener sieht man und fast nur hier *Betula verrucosa*.

Hinsichtlich der Baumverjüngung steht *Picea excelsa* weitaus an erster Stelle. Ueberall warten die jungen Fichtensproßlinge, von Däumlingsgröße an, darauf, daß der Fall eines Stammes ihnen Luft und Licht zu kräftigem Emporstreben verschafft. Oft sprießen sie in geradlinigen Reihen aus dem Moder gefallener Stämme empor. Auf größeren Lücken treten junge schnellwüchsige *Populus tremula* mit ihnen in Konkurrenz, um aber bald in diesem Kampfe zu unterliegen. Von den anderen Baumarten sieht man nur spärlichen Nachwuchs, besonders selten von der Eiche.

Die Energie, mit der *Picea* sich auszubreiten sucht, erklärt sich aus ihrem geringen Lichtbedürfnis und ihrer Fähigkeit, lange Jahre im geschlossenen Bestande als Jungholz auszuharren, bis sich Gelegenheit zum Emporwachsen

bietet. Dabei kommen ihrem hohen Bedarf an Luftfeuchtigkeit die klimatischen Verhältnisse am Rande des Poljesje sehr entgegen. So kann man ohne Uebertreibung von einer Tendenz der Fichte sprechen, sich im Gebiete auf Kosten anderer Bäume auszudehnen. Darauf wurde auch schon oben (p. 18) beim Kiefern-mischwald hingewiesen. Die Beobachtungen aus Bialowies und die von Lehmann (1895, p. 63) für Polnisch-Livland stimmen ganz damit überein. Sobald übrigens infolge Vertorfung der Säuregehalt des Bodens einen gewissen Grad übersteigt, verliert die Fichte ihren Kampfvorteil und muß hinter der Kiefer zurückbleiben. Auf den Moorflächen in den Mischwäldern sieht man daher kaum eine *Picea* unter oft vielen, allerdings kümmerhaften *Pinus*, während die Randzonen recht fichtenreich sein können.

Größere Sträucher sind spärlich eingestreut. Am meisten trifft man noch *Corylus avellana* an. Zuweilen tritt **Ulmus scabra* auf, die ich nur als Strauch, jedoch in ansehnlicher Größe, sah. Hin und wieder finden sich *Viburnum opulus*, *Evonymus verrucosa* und an lichterem Stellen *E. europaea*. Weiden wachsen selten inmitten des Waldes; hier und da einmal eine *Salix caprea*; an den Rändern sind *S. cinerea* und *S. aurita* häufiger; hier sieht man auch gelegentlich Bäume von *S. alba*. Im Walde stets klein und dürftig, an den Rändern kräftiger erscheint *Frangula alnus*. *Daphne mezereum* ist nicht selten. Größere und kleinere Herden bildet *Rubus idaeus*, der sich besonders auf frischen Lichtungen vordrängt. Gelegentlich bemerkt man *R. suberectus* und *Juniperus communis* und nur selten **Ribes nigrum*.

Trotz der im Verhältnis zum Kiefern-mischwald geringeren der Feld- und Bodenschicht zur Verfügung stehenden Lichtmenge ist die Krautvegetation eine sehr dichte. Besonders die schattenliebenden Waldpflanzen, z. B. die Farne, gedeihen bei den günstigen edaphischen Verhältnissen vorzüglich. Aber auch lichtbedürftigere Arten finden geeignete Plätze. Das reich ausgebildete Blattwerk der Krautpflanzen ist für die Entwicklung größerer Moospolster im allgemeinen nicht günstig, um so energischer siedeln die Moose sich auf Baumfüßen und Baumstümpfen an. Wo *Picea* stark vorherrscht, bilden sie auch größere Teppiche. Pilze treten besonders im Herbste in Menge auf und sind ebenfalls in der Hauptsache Holzbewohner. An den Stämmen finden Flechten günstige Standorte.

In dem weit ausgedehnten Gebiet des Fichten-mischwaldes sind die edaphischen und klimatischen Bedingungen nicht überall ganz die gleichen. Es zeigen sich Verschiedenheiten in bezug auf die Bodenfeuchtigkeit, die Wasserbewegung im Boden usw., die, so geringfügig sie an sich sind, doch erhebliche Veränderungen im Pflanzenkleide bewirken. So zerfällt der topographische Komplex des Fichten-mischwaldes in eine große Zahl ökologischer Einheiten, die alle herauszuarbeiten mir bei der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit

nicht möglich war. Immerhin lassen sich schon bei oberflächlicher Betrachtung einige Gruppen herauschälen, deren Schilderung das Gesamtbild keineswegs erschöpft, aber doch einen ausreichenden Ueberblick zu gewähren imstande ist.

Calluna tritt nur noch vereinzelt auf und hat ihre bestandbildende Kraft verloren. Auch *Vaccinium myrtillus* muß seine Führerrolle aufgeben. Ueberhaupt spielen die Kleinsträucher nicht mehr die große Rolle wie im Kiefernwald und im Kiefern-mischwald.

Immerhin gibt es auch im Fichtenmischwald Kleinstrauch-Assoziationen. Sie zeigen Stellen beginnender Versumpfung — besser Vertorfungen — auf nährstoffärmerem Substrate an und besitzen meist nur beschränkte räumliche Ausdehnung. Mit dem an erster Stelle stehenden *Vaccinium vitis idaea* teilen sich *V. uliginosum* und *Ledum palustre* in die Führerschaft. *Vaccinium myrtillus* tritt sehr zurück. Die Moosdecke ist verhältnismäßig gut entwickelt, hauptsächlich besteht sie aus *Polytrichum strictum*, und stellenweise bekunden auch schon Torfmoose, besonders *Sphagnum medium* und *S. cymbifolium* den Beginn der Vertorfung. Eine häufige Erscheinung ist *Trientalis europaea*, ebenso *Pirola secunda*, weniger *P. minor*. *Goodyera repens* ist verbreitet. Weiter sind *Calamagrostis arundinacea*, *Molinia coerulea*, *Carex canescens* (auch in var. *tenuis* Lang), *Crepis paludosa*, gelegentlich an lichter Stellen *Agrostis canina* und im Torfmoose *Viola palustris* charakteristische Angehörige dieser Assoziation.

Wo infolge hohen Grundwasserstandes oder mangelnden Abflusses reichliche Feuchtigkeit den Boden bei reichem Nährstoffgehalt vertorft, trifft man auf eine krautige Massenvegetation, an der *Ranunculus repens* besonders stark beteiligt ist. Hier wadet man oft selbst noch im Hochsommer in reichlichem Wasser. Neben *R. repens* ist *R. flammula* häufig, auch in der Abart *gracilis* G. Mey. *Polygonum hydropiper* tritt herdenweise auf, in dichten Horsten *Carex elongata*, ebenso *Aira caespitosa*. Sehr individuenreich sind *Glyceria fluitans*, *Festuca gigantea*, *Stellaria uliginosa*, *S. nemorum*, *Myosotis palustris*, *Scutellaria galericulata*, *Mentha arvensis*, *Galium palustre*. Häufig *Juncus effusus*, *Rumex obtusifolius*, *Cardamine amara*, *Impatiens noli tangere*, *Lythrum salicaria*, *Lysimachia vulgaris*, *Lycopus europaeus*, an Baumsockeln *Chrysosplenium alternifolium*. *Brunella vulgaris*, eine Pflanze von ganz auffälliger Anpassungsfähigkeit, wächst viel auch an ganz feuchten Stellen. Recht bezeichnend für die Assoziation sind: die häufige *Carex remota*, das mehr zerstreute *Aspidium filix mas* (in var. *affine* Aschrs.) und die selteneren *Lycopodium selago* und (nach Hilbert) **Arum maculatum*. Weiter seien noch *Athyrium filix femina*, *Aspidium cristatum*, *A. spinulosum* subsp. *dilatatum* und zwischen den Eltern *A. cristatum* × *spinulosum*, *Carex Goodenoughii*

(auch in der Abart *recta*) genannt. Ein Moosteppich ist nicht ausgebildet. In Baumbestände tritt neben *Picea* besonders *Alnus glutinosa* hervor, in zweiter Linie auch *Fraxinus excelsior*, die hier häufiger als sonst im ganzen Gebiete ist und auch verhältnismäßig viel Nachwuchs aufweist. Von Sträuchern ist **Ribes nigrum* bemerkenswert, doch findet man ihn nicht häufig; zahlreich erscheinen *Frangula alnus* und *Rubus idaeus*. Im ganzen völlig unwegsame, jungfräuliche Waldbilder von oft erheblicher Ausdehnung.

Auf minder nassem Boden mit ausgesprochenem Vorherrschen der Laubbäume stellt sich eine Genossenschaft vor, die sehr viel Ähnlichkeit mit dem „Krautreichen Kiefernmischwald“ hat. *Alnus glutinosa* und *Fraxinus* treten zurück, *Carpinus betulus* überwiegt *Picea*, und auch *Quercus* und *Acer* sind weit häufiger als sonst im Fichtenmischwald, ebenso *Corylus*, *Daphne* und *Evonymus verrucosa*. *Ulmus scabra* erscheint hier und da in Strauchform. Die Feld- und Bodenschicht weist fast die gleichen Arten auf, wie sie vom „Krautreichen Fichtenmischwald“ beschrieben wurden. Einige, besonders von den dort für die lichtereren Stellen angegebenen, fehlen allerdings, dafür treten neu auf: **Poa remota*, *Festuca gigantea*, *Carex flava* var. **vulgaris*, **Paris quadrifolia*, *Cardamine flexuosa* With., *Polemonium coeruleum*, *Valeriana officinalis* und besonders die hier häufige *Stellaria Friesiana* und die noch häufigere *Circaea alpina*, die man vielleicht geradezu als Leitpflanze der Assoziation ansehen könnte. Von sonstigen Gegensätzen sei noch erwähnt, daß *Melampyrum nemorosum* fehlt und *Carex digitata* hinter *C. pallescens* zurücktritt. *Aspidium spinulosum* kommt in subsp. *euspinulosum* und subsp. *dilatatum* häufig vor, wobei letztgenanntes oft überwiegt; auch der Bastard *A. euspinulosum* × *dilatatum* wurde beobachtet.

An manchen Stellen hat die Fichte sich völlig in den Vordergrund gedrängt. *Carpinus betulus* und *Betula pubescens* sind zwar noch eingesprengt, dagegen treten *Alnus glutinosa*, *Populus*, *Quercus* und *Pinus* ganz zurück. Reichlicher als sonst tritt *Juniperus* auf, *Frangula alnus* ziemlich viel, *Corylus* wenig. Die Bodenschicht zeigt dichte ausgedehnte Moospolster aus *Polytrichum formosum*, *P. juniperinum*, *Hylocomium Schreberi*, *H. splendens*, *Climacium dendroides*, *Thuidium recognitum*, *Dicranum scoparium* usw. Gelegentlich bilden die abgefallenen Fichtennadeln auch eine ziemlich vegetationslose Decke. Die Krautschicht ist ziemlich artenarm. Von Gräsern trifft man im Moose auffällig viel *Triodia decumbens* an, sonst fast nur *Agrostis vulgaris*. *Luzula campestris* erscheint in der subsp. *multiflora*. Hin und wieder sieht man kleinere *Ledum*-Bestände, auch wohl kleinere Bestände von *Vaccinium vitis idaea* oder von *V. uliginosum*. Im Moose wächst *Potentilla tormentilla* zahlreich; sehr zerstreut *Gymnadenia cucullata*, *Listera cordata* und *Pirola uniflora*. Die beiden letztgenannten finden sich nur noch

in der Fichten-Randzone der Wald-Uebergangsmoore. Für die fichtenreichen Waldteile sind auch die Herden von *Equisetum silvaticum* und *E. pratense* charakteristisch.

Wie schon gesagt, löst sich der Fichtenmischwald nicht nur in die wenigen hier besprochenen Assoziationen auf. Es sind lediglich die wichtigsten herausgenommen. Zwischen ihnen gibt es mancherlei Uebergänge und Kombinationen. Bei den einzelnen Gemeinschaften sind immer nur die wesentlichen Elemente genannt. Im übrigen kommen viele der unten in der Gesamtliste zusammengestellten Arten mehr oder weniger in allen Teilen des Fichtenmischwaldes vor. Ueberall sind häufig: *Aspidium spinulosum*, *Stellaria graminea*, *Geranium Robertianum*, *Oxalis acetosella*, *Epilobium palustre*, *Brunella vulgaris* u. a. m.

Eine besondere Behandlung verdient noch die Gemeinschaft der Lichtungspflanzen. Kleinere Lücken, wie sie der Sturm oder die Axt des Menschen in den Baumbestand reißen, werden alsbald von einer bemerkenswerten Gesellschaft besiedelt, die durch das Vorwiegen von *Polygonum*- und *Epilobium*-Arten und von Umbelliferen gekennzeichnet ist. Die Gattung *Polygonum* ist durch Herden von *P. hydropiper* und durch zahlreiches *P. persicaria* und *P. minus* vertreten, *Epilobium* durch sehr viel *E. parviflorum* und *E. palustre*, seltener *E. roseum* und durch das für solche Blößen besonders charakteristische **E. Graebneri* Rubner¹. Gelegentlich *Geum rivale*. Von Umbelliferen fallen die hohen Stauden von *Peucedanum palustre*, die ihnen nachstrebenden von **Cnidium venosum* und die nur wenig niedrigeren von *Selinum carvifolia* auf. Weiter sind u. a. häufig: *Calamagrostis lanceolata*, *Poa trivialis*, *Scirpus silvaticus*, *Carex Goodenoughi* var. *recta*, *Juncus effusus*, *Rumex obtusifolius* (gelegentlich auch **R. sanguineus* und mehrfach **R. obtusifolius* × *sanguineus*), *Filipendula ulmaria*, *Impatiens noli tangere*, *Lythrum salicaria*, *Mentha arvensis*, *Scrophularia nodosa* und das schöne *Cirsium lanceolatum* subsp. *silvaticum*, dessen Grundblattrosetten von oft weit über $\frac{1}{2}$ m großem Durchmesser mit ihrer kunstvollen Architektur einen Schmuck des Bodens bilden. Also eine augenfällige Schar, die sich schnell einfindet, aber auch schnell wieder verschwindet. Denn der Baumnachwuchs, vor allem *Picea* und *Populus*, schließt die Lücke gar bald. Während im Kiefernmischwald infolge des geringeren Belichtungsgegensatzes zwischen lichtem Wald und Lichtung nur eine langsame Verschiebung in der Konzentration der Arten stattfindet, verläuft der ganze Prozeß bei den stärkeren Lichtgegensätzen und der fruchtbaren Feuchte des Fichtenmischwaldes viel schneller und in weit steileren

¹ Die Gattung *Epilobium* wurde von K. Rubner-München revidiert

Kurven, ähnlich, wie wir es von unseren mitteldeutschen Waldschlägen mit *Epilobium angustifolium*, *Digitalis purpurea* usw. kennen.

Unter den über 150 Gefäßpflanzen des Fichtenmischwaldes sind nur 10 nicht ausdauernd: *Polygonum hydropiper*, *P. persicaria*, *P. minus*, *Cerastium triviale*, *Moehringia trinervia*, *Cardamine flexuosa*, *Geranium Robertianum*, *Impatiens noli tangere*, *Melampyrum pratense*, *Cirsium lanceolatum* subsp. *silvaticum*. Sie finden sich alle auf den Lichtungen besonders häufig ein.

Im ganzen setzt sich die Vegetation des Fichtenmischwaldes etwa aus folgenden Arten zusammen:

Flechten an Stämmen: *Lobaria pulmonaria*, *Parmelia physodes*, *P. sulcata*, *P. furfuracea*, *Evernia prunastri*, *Usnea hirta*, *Pertusaria globulifera*, *Alectoria implexa*.

Moose an Stämmen: *Neckera pennata*, *Leucodon sciuroides*; an Baumstümpfen: *Brachythecium salebrosum*, *B. velutinum*, *Mnium cuspidatum*; auf Wurzelballen gestürzter Bäume: *Ceratodon purpureus*; auf dem Boden des Waldes: *Polytrichum commune*, *P. formosum*, *P. juniperinum*, *Hylocomium Schreberi*, *H. splendens*, *H. triquetrum*, *Dicranum undulatum*, *D. scoparium*, *Thuidium recognitum*, *Brachythecium rutabulum*, *Climacium dendroides*, *Sphagnum cymbifolium*, *S. medium*, *S. quinquefarium*, *S. Girgensohnii*, *S. squarrosum*.

Athyrium filix femina cop.

Aspidium dryopteris cop. gr.

A. thelypteris sp.

A. filix mas sp.

A. cristatum sp.

A. spinulosum cop. in subsp. *euspinulosum* und subsp. **dilatatum* (einmal auch in *euspinulosum* × *dilatatum*)

A. cristatum × *spinulosum* sol.

Pteridium aquilinum sp.

Equisetum silvaticum cop. gr.

E. pratense sp. gr.

Lycopodium selago sp.

L. annotinum cop. gr.

L. clavatum sp.

Picea excelsa soc.

Pinus silvestris cop.

Juniperus communis cop.

Anthoxanthum odoratum cop.

Milium effusum sp.

Agrostis vulgaris cop.

Calamagrostis lanceolata sp.

C. arundinacea cop.

Aira caespitosa cop.

Triodia decumbens cop.

Molinia coerulea sp.

Melica nutans sp.

**Poa remota* sp.

P. trivialis sp.

Glyceria fluitans sp.

Festuca gigantea cop.

Scirpus silvaticus sp.

Carex remota cop.

C. leporina sp.

C. elongata sp.

C. canescens cop. (auch var. *tenuis* Lang sp.)

C. Goodenoughii cop.

C. Goodenoughii var. *recta* sp.

C. pallescens cop.

C. digitata sp.

C. silvatica sp.

C. flava var. **vulgaris* sp.

**Arum maculatum* sp.

Juncus effusus sp.

- Luzula pilosa* cop.
L. campestris cop.
L. campestris subsp. *multiflora* sp.
L. Sudetica prol. *pallidescens* sp.
Majanthemum bifolium cop.
**Paris quadrifolia* sp.
Orchis maculatus sp.
Gymnadenia cucullata sp.
Platanthera bifolia sp.
Listera cordata sp.
Neottia nidus avis sp.
Goodyera repens sp.
Populus tremula cop.
Salix alba sp.
S. cinerea sp.
S. caprea sp.
S. aurita sp.
Carpinus betulus soc.
Corylus avellana cop.
Betula verrucosa sp.
B. pubescens cop.
Alnus glutinosa cop.
Quercus robur cop.
**Ulmus scabra* sp.
Urtica dioica sp.
Viscum album sp. (auf *Populus tremula*)
Asarum europaeum sp.
Rumex obtusifolius cop.
*R. *sanguineus* sp.
*R. *obtusifolius* × *sanguineus* sp.
Polygonum persicaria sp.
P. hydropiper cop. gr.
P. minus cop.
Lychnis flos cuculi sp.
Stellaria uliginosa sp.
S. nemorum sp.
S. holostea cop.
S. graminea cop.
S. Friesiana cop.
Cerastium triviale cop.
C. triviale var. *nemorale* sp.
Moehringia trinervia cop.
Anemone nemorosa cop.
Hepatica nobilis cop.
Ranunculus flammula cop.
R. flammula var. *gracilis* sp.
R. repens cop. gr.
R. auricomus sp.
R. acer sp.
R. lanuginosus sp.
Cardamine flexuosa With. sp.
C. amara sp.
Dentaria bulbifera sp.
Chrysosplenium alternifolium cop.
**Ribes nigrum* sp.
Filipendula ulmaria sp.
Pirus aucuparia sp.
Rubus saxatilis sp.
R. idaeus cop.
R. suberectus sp.
Fragaria vesca sp.
Potentilla tormentilla cop.
Geum strictum sp.
G. rivale sp.
Vicia silvatica sp.
Lathyrus pratensis sp.
L. montanus sp.
L. vernus sp.
Geranium Robertianum cop.
Oxalis acetosella cop.
Evonymus europaea sp.
E. verrucosa sp.
Acer platanoides cop.
Impatiens noli tangere cop.
Frangula alnus cop.
Viola palustris sp.
V. silvestris sp.
V. Riviniana sp.
V. canina sp.
Daphne mezereum cop.
Lythrum salicaria cop.
Epilobium parviflorum sp.
E. montanum cop.
**E. roseum* sp.
E. palustre cop.
**E. Graebneri* sp.
Circaea alpina cop. gr.
Aegopodium podagraria sp.
**Cnidium venosum* sp.
Angelica silvestris sp.
Selinum carvifolia cop.
Peucedanum palustre sp.
Pirola uniflora sp.
P. secunda cop.
P. rotundifolia sp.

<i>P. minor</i> sp.	<i>Solanum dulcamara</i> sp.
<i>Ledum palustre</i> cop.	<i>Scrophularia nodosa</i> sp.
<i>Vaccinium vitis idaea</i> cop.	<i>Veronica chamaedrys</i> sp.
<i>V. myrtillus</i> sp.	<i>V. officinalis</i> sp.
<i>V. uliginosum</i> cop.	<i>V. serpyllifolia</i> sp.
<i>Calluna vulgaris</i> sp.	<i>Melampyrum pratense</i> cop.
<i>Lysimachia vulgaris</i> cop.	<i>Lathraea squamaria</i> sp.
<i>Trientalis europaea</i> cop.	<i>Asperula odorata</i> cop.
<i>Fraxinus excelsior</i> cop.	<i>Galium palustre</i> cop.
<i>Polemonium coeruleum</i> sp.	<i>G. Schultesii</i> sp.
<i>Pulmonaria officinalis</i> sp.	<i>Viburnum opulus</i> sp.
<i>Myosotis palustris</i> cop.	<i>Valeriana officinalis</i> sp.
<i>Ajuga reptans</i> sp.	<i>Solidago virga aurea</i> cop.
<i>Scutellaria galericulata</i> cop.	<i>Cirsium lanceolatum</i> subsp. silva-
<i>Glechoma hederacea</i> sp.	larum Jord. sp.
<i>Brunella vulgaris</i> cop.	<i>Serratula tinctoria</i> sp.
<i>Lamium galeobdolon</i> cop.	<i>Crepis paludosa</i> cop.
<i>Lycopus europaeus</i> sp.	<i>Hieracium murorum</i> subsp. silvu-
<i>Mentha arvensis</i> cop.	ticum cop.

Die Waldwege des Fichtenmischwaldes beherbergen auf ihrem oft recht feuchten Sande manche im umgebenden Forste sonst nicht vertretene Pflanze, so: *Poa annua*, *Juncus squarrosus*, *J. bufonius*, *J. lampocarpus*, *Polygonum aviculare*, *P. tomentosum*, *P. nodosum*, seltener *P. mite* (das auch sonst im Walde auftretende *P. minus* ist auf feuchten Sandwegen besonders häufig), *Gypsophila muralis*, *Stellaria media*, *Herniaria glabra* var. *puberula*, *Potentilla argentea* in Schattenform, *P. norvegica*, *Medicago lupulina* var. *Willdenowii*, *Trifolium hybridum*, *T. repens*, *Callitriche verna* in Landform, *Peplis Portula*, *Plantago major*, *Gnaphalium uliginosum*, *G. luteo-album*. Selbst *Artemisia absinthium* findet sich gelegentlich in Schattenform. Auch die im Gebiete nicht einheimische *Bellis perennis* wurde einmal angetroffen, ebenso der sonst nicht beobachtete **Alopecurus pratensis*.

8. Wacholdertrift.

Nicht selten findet man auf Gelände, das seiner ganzen Natur nach durchaus dazu bestimmt erscheint, einen Fichten-Mischwald zu tragen, einen mehr oder weniger dichten *Juniperus*-Bestand. Solche *Junipereta* liegen meist in der Nähe von Siedelungen, und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß man es hier wie bei den oben geschilderten Buschtriften mit Rodungen zu tun hat, die zur Weidenutzung dienen. Das bezeugen unter anderem die vom Weidevieh verbissenen Kümmerexemplare von *Picea excelsa*. Auch *Pinus silvestris* und *Betula pubescens* treten in solchen Verbißformen auf. Ferner sieht man Sträucher von *Frangula alnus*, *Viburnum opulus*, *Salix cinerea*,

S. aurita, *S. depressa* var. *livida*, auch die Bastarde *S. cinerea* × *aurita* und *S. aurita* × *livida*. *Juniperus communis*, durch seine stechenden Blätter geschützt, beherrscht vollkommen das Feld.

Die Krautschicht ist reich entwickelt. Gräser sind zahlreich, besonders *Anthoxanthum odoratum*, *Agrostis vulgaris*, *Triodia decumbens* und gelegentlich *Nardus stricta*. Von Seggen bemerkt man viel *Carex canescens*, *C. Goodenoughii* und besonders *C. pallescens*, an trockeneren Stellen auch **C. pilulifera*. Recht häufig ist *Juncus Leersii*. Charakteristische Erscheinungen sind ferner: *Luzula campestris*, in den Unterarten *vulgaris* und *multiflora*, *Potentilla tormentilla*, *Polygala vulgaris*, *Hypericum perforatum*, *H. quadrangulum*, *Selinum carvifolia*, *Calluna vulgaris*, *Brunella vulgaris*, *Veronica chamaedrys*, *Euphrasia curta*, *Succisa pratensis*, *Achillea millefolium*, *Chrysanthemum leucanthemum*, *Centaurea jacea*. Feuchtere Stellen weisen besonders viel *Stellaria graminea*, *Ranunculus flammula* und *Galium uliginosum* auf, wohl auch *Viola palustris*. Von Kleinsträuchern wie *Vaccinium* und *Calluna* tritt nur *V. vitis idaea* reichlicher auf.

Wenn das Terrain auch im ganzen feucht ist, so fehlen doch auch nicht etwas trockenere Stellen. Diese kleinen Schwankungen im Feuchtigkeitsgrade des Bodens begünstigen die Vereinigung einer verhältnismäßig reichen Zahl von Arten:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| <i>Pteridium aquilinum</i> sp. | <i>J. lampocarpus</i> sp. |
| <i>Lycopodium clavatum</i> sp. | <i>J. alpinus</i> sp. |
| <i>Picea excelsa</i> cop. | <i>Luzula campestris</i> (subsp. <i>vulgaris</i> |
| <i>Pinus silvestris</i> sp. | und subsp. <i>multiflora</i>) cop. |
| <i>Juniperus communis</i> soc. | <i>Salix cinerea</i> sp. |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> cop. | <i>S. aurita</i> sp. |
| <i>Phleum pratense</i> sp. | <i>S. depressa</i> var. <i>livida</i> sp. |
| <i>Agrostis vulgaris</i> cop. | <i>S. cinerea</i> × <i>aurita</i> sp. |
| <i>A. canina</i> sp. | <i>S. aurita</i> × <i>livida</i> sp. |
| <i>Aira caespitosa</i> sp. | <i>Betula pubescens</i> cop. |
| <i>Triodia decumbens</i> cop. | <i>Rumex acetosa</i> sp. |
| <i>Molinia coerulea</i> sp. | <i>Polygonum convolvulus</i> sp. |
| <i>Briza media</i> sp. | <i>Lychnis flos cuculi</i> sp. |
| <i>Cynosurus cristatus</i> sp. | <i>Dianthus deltoides</i> sp. |
| <i>Festuca rubra</i> sp. | <i>Stellaria graminea</i> cop. |
| <i>Nardus stricta</i> cop. | <i>Cerastium triviale</i> cop. |
| <i>Carex stellulata</i> sp. | <i>Ranunculus flammula</i> cop. |
| <i>C. leporina</i> sp. | <i>R. acer</i> sp. |
| <i>C. canescens</i> cop. | <i>Fragaria vesca</i> cop. |
| <i>C. Goodenoughii</i> cop. | <i>Potentilla tormentilla</i> cop. |
| * <i>C. pilulifera</i> sp. | <i>P. anserina</i> sp. |
| <i>C. pallescens</i> cop. | <i>Trifolium strepens</i> sp. |
| <i>Juncus Leersii</i> cop. | <i>T. hybridum</i> sp. |

<i>T. pratense</i> sp.	<i>Euphrasia stricta</i> sp.
<i>Vicia cracca</i> sp.	<i>E. curta</i> sp.
<i>Polygala vulgaris</i> cop.	<i>Alectorolophus major</i> sp.
<i>Frangula alnus</i> cop.	<i>Plantago lanceolata</i> sp.
<i>Hypericum perforatum</i> cop.	<i>Galium uliginosum</i> cop.
<i>H. quadrangulum</i> cop.	<i>Viburnum opulus</i> sp.
<i>Viola palustris</i> sp.	<i>Succisa pratensis</i> cop.
<i>V. canina</i> sp.	<i>Campanula glomerata</i> sp.
<i>Pimpinella saxifraga</i> sp.	<i>C. patula</i> sp.
<i>Selinum carvifolia</i> sp.	<i>Solidago virga aurea</i> sp.
<i>Vaccinium vitis idaea</i> cop.	<i>Gnaphalium silvaticum</i> sp.
<i>V. myrtillus</i> sp.	<i>Achillea millefolium</i> cop.
<i>Calluna vulgaris</i> sp.	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> cop.
<i>Erythraea centaurium</i> sp.	<i>Cirsium palustre</i> sp.
<i>Gentiana pneumonanthe</i> sp.	<i>Centaurea jacea</i> sp.
<i>Brunella vulgaris</i> cop.	<i>Léontodon autumnalis</i> sp.
<i>Stachys betonica</i> sp.	<i>Hieracium pilosella</i> subsp. <i>impexum</i>
<i>Thymus chamaedrys</i> sp.	<i>Zahn</i> cop.
<i>T. serpyllum</i> sp.	<i>H. auricula</i> subsp. <i>littuanicum</i> N. P.
<i>Mentha arvensis</i> cop.	sp. und subsp. <i>*auricula</i> N. P.
<i>Veronica chamaedrys</i> cop.	sp.
<i>V. officinalis</i> sp.	<i>H. floribundum</i> sp.
<i>Melampyrum pratense</i> sp.	<i>H. umbellatum</i> sp.

Gelegentlich gehen Wacholdertriften auch in Wiesengelände über. Solche echten Wiesen — aber nicht wirkliche „Natur“-Wiesen, denn sie verdanken ihre Entstehung und Erhaltung sicherlich der Tätigkeit des Menschen — sah ich nicht viele, da der Bedarf an Heufutter wohl hauptsächlich durch die Mahd der zahlreichen Wiesenmoore gedeckt wird. Die Gras- und Krautvegetation stimmt fast ganz mit der der eigentlichen Wacholdertriften überein. Es treten hinzu *Festuca elatior*, *Carex pallescens* f. *elatior* Aschers. u. Graebn., *Gladiolus imbricatus*, *Platanthera bifolia*, *Epipactis palustris*, **Thalictrum minus*, *Geranium pratense*, **Gentiana Amarella*, *Polemonium coeruleum*, **Scabiosa columbaria* (nach Dr. Carnap), *Hieracium pratense* subsp. *silvicolum* Fr.

8b. Anmoorige Trift.

Eine recht abweichende Ausbildung erhalten die Triften dort, wo sie auf feuchtem anmoorigen Boden stehen. Zwar bedingt *Juniperus* auch hier als einziger Strauch die Physiognomie des Geländes, aber Feld- und Bodenschicht sind in recht anderer Weise zusammengesetzt. *Calluna* gedeiht üppig und gibt dem Ganzen einen heideartigen Einschlag. Dazwischen wachsen zahlreiche Gräser und Kräuter. *Nardus stricta* bildet ausgedehnte Rasen. Von

Seggen sind *Carex Goodenoughii* und *C. flava* var. **Oederi* häufig; *C. hirta* erfüllt niedrige Böschungen. Auffällig viel erscheint *Juncus Leersii*, reichlich *J. lampocarpus*, stellenweise auch *J. squarrosus* und *J. alpinus*. Eine wohlgeschlossene Gesellschaft bilden: *Juncus bufonius*, *Polygonum aviculare*, *Gypsophila muralis*, *Sagina procumbens*, *Ranunculus flammula*, *R. sceleratus*, **Nasturtium silvestre*, *N. palustre*, *Radiola linoides*, *Callitriche verna* (in Landform), *Peplis portula*, *Mentha arvensis*, *Veronica scutellata* — auch in der Abart **parvularia* —, *Plantago major* var. *nana*, *Filago minima*, *Gnaphalium uliginosum*. Weiter sind *Alopecurus geniculatus*, *Polygonum tomentosum*, *Ranunculus repens*, *R. acer*, *Gentiana pneumonanthe*, *Veronica serpyllifolia*, *Euphrasia stricta* (auch in var. **brevipila*), *E. curta* und **Alectorolophus minor* erwähnenswert.

8c. Erlen-Wacholder-Trift.

Einen auch physiognomisch ganz anderen Eindruck gewähren Triften, denen Erlen in Strauch- und Baum-Form den Charakter geben. Der Boden ist sehr uneben. Kleine Höcker wechseln mit flachen Vertiefungen ab. Auf den Höckern stehen Erlen, deren Sockel das Gerüst der Erhöhungen bilden. Man hat es mit früheren Erlenfließen zu tun, die trocken gelegt worden sind. Doch sieht man solche Zeichen der Entwässerung nur selten. Der Boden ist, wenigstens im Sommer, recht trocken. Zu Zeiten erhöhten Grundwasserstandes füllen sich die Vertiefungen zum Teil mit Wasser. In das ursprüngliche Alnetum ist *Juniperus communis* eingewandert und bildet nun mit *Alnus glutinosa* einen Mischbestand, bei dem beide Partner etwa in gleicher Zahl vertreten sind oder doch der Wacholder nur wenig hinter der Erle zurücksteht. *Picea excelsa* stellt sich vereinzelt in jungen Exemplaren ein. *Frangula alnus* ist häufig. Die Bestände sind recht grasreich und dienen ebenso als Weide wie die eben beschriebenen Triften. In den Vertiefungen findet man *Aira caespitosa*, *Juncus effusus*, *Polygonum hydropiper*, *Viola palustris* (im feuchten Moose), *Lysimachia vulgaris*, *Lycopus europaeus*, *Galium palustre*. Sonst sind noch *Aspidium spinulosum*, *Agrostis vulgaris*, *Carex leporina*, *Potentilla tormentilla* und die auffällig häufige *P. anserina*, weiter *Oxalis acetosella*, *Brunella vulgaris* und *Gnaphalium silvaticum* zu nennen.

9. Vegetation feuchter Gräben.

Viele Gräben, die in Zeiten erhöhter Niederschläge und vor allem während der Schneeschmelze fließendes Wasser führen, liegen im Sommer mehr oder weniger wasserfrei da. Doch haben Sohle und Böschungen meist noch Feuchtigkeit genug, um eine üppige Vegetation entfalten zu können.

I. Gräben im Waldgelände.

In den Gräben des bewaldeten Geländes drängen sich die feuchtigkeitsbedürftigen Waldpflanzen zusammen. Große Moospolster aus *Polytrichum*, aber auch gelegentlich aus *Sphagnum*, erfüllen den Grabengrund. Daraus sprießen *Carex remota*, *Stellaria uliginosa*, *S. graminea*, *Ranunculus flammula*, *Oxalis acetosella*, *Trientalis europaea*, *Myosotis plustris*, *Veronica scutellata*, *Galium uliginosum*. Dem Moose schmiegt sich *Viola palustris* an, im *Sphagnum* gedeiht *Drosera rotundifolia*. Häufig sieht man *Chrysosplenium alternifolium*. An manchen Stellen deckt *Hottonia palustris* mit dichtem Teppich die Sohle, wieder an anderen überzieht *Ranunculus repens* den ganzen Graben. Wo sich dauernd etwas Wasser hält, erheben sich *Alisma plantago*, *Phalaris arundinacea*, *Glyceria fluitans*, *Juncus effusus*, *Lythrum salicaria*, *Lycopus europaeus*, *Mentha aquatica*, *Bidens cernuus*. Im Wasser schwimmt *Callitriche verna* oder liegt (in der Landform) auf dem feuchten Sande. Selten trifft man *Sparganium simplex*, noch seltener *S. minimum* an. Die Grabenböschungen besiedeln *Athyrium filix femina*, *Aspidium filix mas*, *A. spinulosum*, *Phleum pratense*, *Agrostis vulgaris* (in der Abart *stolonifera* Koch sich in dichter Decke über Wand und Sohle des Grabens legend), *Poa trivialis*, *Juncus lampocarpus*, *Polygonum tomentosum*, *P. persicaria*, auch die im Gebiete weit selteneren *P. nodosum* und *P. mite*, während *P. hydropiper* mehr den nassen Grabengrund bevorzugt und *P. minus* sich über das Moos, auch über *Sphagnum*, legt, *Geum strictum*, *Epilobium palustre*, *Lysimachia vulgaris*, *Scutellaria galericulata*, *Scrophularia nodosa*, *Galium palustre*, *Valeriana officinalis* und (nach Dr. C a r n a p) *Achillea ptarmica*. Die oberen Ränder suchen *Stellaria Friesiana*, *Cardamine flexuosa* With. (auch in der var. *interrupta* (Cel.) O. E. Schulz), *Potentilla tormentilla*, *Alchemilla vulgaris*, *Circaea alpina*, *Brunella vulgaris* auf; häufig auch *Vaccinium vitis idaea*; dagegen steigt *V. uliginosum* mehr nach unten. Besonders bezeichnend für die Waldgräben ist die hier überall häufige *Stellaria aquatica*.

II. Gräben im offenen Gelände.

Eine ganz andere Gemeinschaft besiedelt die Gräben im baumfreien Gelände. Die Schattenpflanzen verschwinden, lichtbedürftige treten an ihre Stelle. Es sind die Arten der Genossenschaft, die Graebner (1909, p. 266 ff.) für kahle Ufer und ausgetrocknete Teiche angibt, Arten von einigermaßen vagabondierender Lebensweise. Sie haben nur geringe Aussicht, mehrere Generationen hindurch den gleichen Wuchsort zu behaupten. Denn allzusehr sind sie von der Menge der Niederschläge abhängig, die, in zu reichem Maße gegeben, ihre Stätte versanden oder verschlammten, und, in zu geringem Maße gespendet, den Standort ausdorren lassen. Sie sind daher in

der Mehrzahl Hapaxanthen. Soweit sie ausdauern, handelt es sich um Pflanzen von starker vegetativer Verbreitungsfähigkeit, die ihnen die Möglichkeit gibt, sich anbietende günstige Wohnplätze schnell mit Beschlag zu belegen. Die Genossenschaft ist in nicht unbeträchtlichem Maße von der Tätigkeit des Menschen abhängig. Doch schafft ihnen und schuf ihnen schon in prähistorischer Zeit die flözende Gestaltungskraft des Wassers das zur Erhaltung der Art benötigte Neuland in steter Wiederholung. Auf ungestörter Stätte werden sie bald durch die Konkurrenz der anderen Arten erdrückt. An Ufern von Teichen usw. bewirkt wechselnder Wasserstand zusagende ökologische Bedingungen.

In feuchten sandigen Gräben findet man mit großer Regelmäßigkeit: *Setaria glauca*, *Juncus bufonius*, *J. capitatus*, *Gypsophila muralis*, *Sagina procumbens*, *Arenaria serpyllifolia*, *Spergula arvensis*, *Spergularia rubra*, *Herniaria glabra* var. *puberula*, *Scleranthus annuus*, *Ranunculus flammula* — auch in der Abart *gracilis* G. Mey.; Hilbert gibt *R. reptans* an —, *Nasturtium palustre*, *Radiola linoides*, *Callitriche verna* (in Landform), *Peplis portula*, **Centunculus minimus*, *Myosotis caespitosa*, *Plantago major* var. *nana*, *Filago minima*, *Gnaphalium uliginosum*. Dazu treten mehr oder weniger oft: *Scirpus palustris*, *Juncus Leersii*, *J. lampocarpus*, *Polygonum aviculare*, *P. tomentosum* (auch in f. *incanum*), *P. persicaria*, *P. hydropiper*, *P. minus*, *Ranunculus repens*, *Linum catharticum*, *Hypericum humifusum*, *Anagallis arvensis*, *Veronica beccabunga* und *V. anagallis*, *Galium uliginosum* und seltener *Gnaphalium luteo-album*.

In den Furchen sandiger Aecker und Brachen findet man fast dieselben Arten.

Wo durch Verschlammung ein reicherer Lehmgehalt entstanden ist, treten folgende bezeichnende Arten hinzu: **Cyperus flavescens*, **Scirpus ovatus* und **Limosella aquatica*. Weiter auch *Epilobium palustre*, *Lysimachia vulgaris*, *Myosotis intermedia*, *Mentha arvensis*, *Veronica serpyllifolia*, *Leontodon autumnalis* usw., während dann *Spergularia rubra*, *Herniaria glabra*, *Myosotis caespitosa* u. a. m. zurücktreten.

10. Erlenfließ.

In den Rillen, die dauernd das überschüssige Wasser aus den Mischwaldkomplexen in erst schmalen und dann sich durch Vereinigung immer mehr verbreiternden Bahnen mit meist kaum merkbarem Gefälle nach der Schtschара und ihren Nebenflüssen hinführen, gedeiht üppig die Vegetation des „Erlenfließes“. *Alnus glutinosa* beherrscht in durchschnittlich 20 m aufragenden, z. T. auch erheblich höheren und recht kräftigen Exemplaren das Bild. Neben ihr erscheinen, doch in weit geringerer Zahl *Picea excelsa*, *Fraxinus excelsior*,

und *Betula pubescens*; an lichterem Stellen auch *Salix alba*, gelegentlich mit *Viscum album* besetzt.

Unter den oft reichlich vertretenen Sträuchern spielen die Weiden die Hauptrolle: *Salix pentandra*, *S. cinerea*, *S. caprea*, *S. aurita* und seltener *S. dasyclados*. Daneben sind *Rubus idaeus*, *Frangula alnus* und *Viburnum opulus* häufig; sie bevorzugen die Randpartien. Durch das Gestrüpp schlingen sich *Humulus lupulus* und *Solanum dulcamara*.

Farne sind wohl entwickelt. *Athyrium filix femina* und *Aspidium thelypteris* bilden Büsche, *A. spinulosum* ist mehr zerstreut, und *A. dryopteris* wächst hier und da an Baumsockeln. Ueppige Krautvegetation bilden im Wasser: *Alisma plantago*, *Calla palustris*, *Iris pseud-acorus*, *Rumex hydro-lapathum*, *Lythrum salicaria*, *Cicuta virosa*, *Sium latifolium*, *Peucedanum palustre*, *Menyanthes trifoliata*, *Lycopus europaeus*, *Bidens cernuus*, nebst den Frühblühern: *Caltha palustris*, *Hottonia palustris* und *Lysimachia thyrsiflora*. Mehr nach dem Trockenen hin ragen *Urtica dioica* (nicht sehr zahlreich), *Rumex crispus*, *Filipendula ulmaria*, *Impatiens noli tangere*, *Angelica silvestris*, *Lysimachia vulgaris*, *Cirsium oleraceum* und *C. palustre* hervor. Dazwischen sind in Menge: *Polygonum hydropiper*, *P. minus*, *Ranunculus repens*, *Myosotis palustris*, *Scutellaria galericulata*, *Galium palustre* und mehr vereinzelt: *Ranunculus flammula*, *Comarum palustre*, *Geum rivale*, *Geranium Robertianum*, *Epilobium palustre* eingestreut. An Stubben und auf Wurzelwerk sieht man viel *Viola palustris* und in Herden *Chrysosplenium alternifolium*. Hier auch gelegentlich *Circaea alpina*. Die Gattung *Stellaria* ist mit sehr viel *S. uliginosa* und *S. graminea*, mit viel *S. palustris* und weniger *S. nemorum* vertreten. Von Gräsern wachsen im Wasser Bestände von *Glyceria fluitans*, mehr vereinzelt *Phragmites communis* und nach dem Ufer hin zahlreich *Calamagrostis lanceolata* und *Aira caespitosa*. Unter den Seggen bevorzugen *Carex pseudocyperus* und *C. vesicaria* Standorte von größerer Feuchtigkeit, *C. elongata* die nassen Ränder von Baumsockeln, *C. remota*, *C. canescens*, *C. Goodenoughi* und gelegentlich *C. loliacea* die Verlandungszonen; hier und da *Scirpus silvaticus*. Im offenen Wasser schwimmen in Menge *Hydrocharis morsus ranae*, *Lemna polyrrhiza* und *L. minor* und weniger *L. trisulca*.

11. Ufersumpf.

Das Ufergelände der Schtschara und ihrer größeren Nebenflüsse Myschanka und Lipnitsa weist in der Hauptsache Wiesenmoore und Ufersümpfe auf. Die Ufersümpfe gehen vielfach in Wiesenmoore, teilweise auch in Erlenflüsse über.

Das Sumpfgelände trägt eine üppige Vegetation. Vereinzelte Weidensträucher, hauptsächlich *Salix cinerea* und *S. aurita* mischen sich in große Be-

stände hochwüchsiger Gräser und Kräuter. Besonders in Buchten erstehen Dickichte von *Phragmites communis* oder von *Typha angustifolia*, auch kleinere von *Glyceria aquatica* und von *Equisetum heleocharis*. Das offene Wasser umkränzen: *Sagittaria sagittifolia*, *Alisma plantago*, *Butomus umbellatus*, *Carex pseudocyperus*, *C. acutiformis*, *Iris pseudacorus*, *Rumex hydro-lapathum* (nach Dr. Carnap auch *R. aquaticus*), *Lythrum salicaria*, *Cicuta virosa*, *Sium latifolium*, *Stachys palustris*, *Eupatorium cannabinum*, *Bidens cernuus*. Im Uferschlamm treten dazu *Aspidium thelypteris*, *Calamagrostis lanceolata*, *Glyceria fluitans*, *Acorus calamus*, *Polygonum amphibium*, *Ranunculus lingua*, *Nasturtium amphibium*, *Filipendula ulmaria*, *Comarum palustre*, *Peucedanum palustre*, *Lysimachia thyrsiflora*, *L. vulgaris*, *Menyanthes trifoliata*, dazwischen kleine Herden von *Calla palustris* und größere von *Stratiotes aloides*. Noch mehr nach dem Ufer hin halten sich vorzugsweise *Athyrium filix femina*, *Agrostis alba*, *Urtica dioica*, *Rumex crispus*, *Caltha palustris*, *Ranunculus flammula*, *Epilobium palustre*, *Galium palustre*, *Valeriana officinalis*, *Bidens radiatus* (nach Hilbert). *Hottonia palustris* bildet in seichtem Wasser dichte Teppiche. *Humulus lupulus* und *Solanum dulcamara* klettern an Sträuchern und Ufer-Erlen in die Höhe. Auf dem Wasser schwimmen *Hydrocharis morsus ranae*, *Lemna polyrrhiza*, *L. minor*, *L. trisulca* (untergetaucht) und hin und wieder *Callitriche verna*. Tiefere Buchten erfüllen *Ceratophyllum demersum*, *Myriophyllum verticillatum*, und zwischen die Seerosen: *Nymphaea candida* und *Nuphar luteum* mischen sich zahlreiche Laichkräuter: *Potamogeton obtusifolius*, *P. perfoliatus*, *P. lucens* und *P. natans*. Auch *Elodea canadensis* tritt auf, doch nicht in Menge.

Im Zusammenhange mit den Sumpfbildungen der Flußufer mag die Ufervegetation des Wygonoskoje-Sees besprochen werden.

Der See, etwa 25 qkm groß, liegt inmitten eines weiten Moorgeländes, teils von Bruchwald, zum größeren Teile von Strauchmoorflächen umgeben. Er ist sehr flach und hat ganz seichte moderig-schlammige Ufer, die eine reiche Vegetation in zonenförmiger Anordnung aufweisen. Am weitesten dringt *Scirpus lacustris* vor und bildet bei der geringen Tiefe des Sees oft weit vom Ufer abgelegene große Bestände. Nach dem Strande hin schließen sich *Typha latifolia* und *Typha angustifolia* sowie *Glyceria aquatica* an und im eigentlichen Ufermoder eine individuenreiche Gesellschaft von *Sparganium simplex*, *Sagittaria sagittifolia*, *Alisma plantago*, *Phragmites communis* (nicht allzu zahlreich), *Rumex hydro-lapathum*, *Polygonum amphibium*, *Ranunculus repens*, *Lythrum salicaria*, *Epilobium palustre*, *Cicuta virosa*, *Peucedanum palustre*, *Lysimachia vulgaris*, *Lycopus europaeus*, *Eupatorium cannabinum*, *Bidens cernuus*. Davor und dazwischen, zum Teil angeschwemmt, erfüllen das Wasser: *Potamogeton perfoliatus*, *P. natans*, *Elodea canadensis*,

Stratiotes aloides, *Hydrocharis morsus ranae*, *Calla palustris*, *Lemna polyrrhiza*, *L. minor*, *Nymphaea candida*, *Ceratophyllum demersum*. Ein Teil der Uferpflanzen geht noch weiter auf das Land hinauf und mischt sich in das schmale Kiefern-Erlen-Band ein, das den See streckenweise begleitet. Hier treten hinzu: *Athyrium filix femina*, *Aspidium thelypteris*, *A. spinulosum*, *Poa serotina*, *Urtica dioica*, *Polygonum hydropiper* (in Massen), *P. tomentosum*, *Potentilla norvegica*, *Solanum dulcamara*. Von Bäumen und Sträuchern zeigen sich die tonangebenden *Alnus glutinosa* und *Pinus silvestris* (landeinhwärts immer mehr hervortretend), zahlreiche *Salices*, vereinzelte *Pirus aucuparia* und gut entwickelte *Frangula alnus*.

In dem Oginski-Kanale, dessen nördliches Schluß-Stück den See mit der Schtschara verbindet, hatten sich infolge des mangelnden Verkehrs die Wasserpflanzen recht breit gemacht. Hier fiel *Elodea canadensis* durch dichte Massen auf.

12. Wiesenmoor.

Die in den Talauen der Schtschara und ihrer Nebenflüsse gelegenen wiesenartigen Flächen sind Produkte der Verlandung, die im natürlichen Entwicklungsprozesse bis zum Flachmoorstadium gediehen sind und unter der Einwirkung der Ueberschwemmungen und Eisgänge auf dieser Stufe als Wiesenmoore verharren. Man findet nur wenige, vereinzelte Bäume, wie *Salix alba* und *Alnus glutinosa*, häufiger dagegen Gesträuch von *Salix dasyclados*, *S. aurita*, *S. depressa* var. *livida* (auch *S. aurita* × *livida*), *S. lapponum*, *S. repens* und anderen Weiden, von *Alnus glutinosa*, *Betula pubescens* (selten *B. humilis*) und *Frangula alnus*, an Gräben auch *Viburnum opulus*. Gräser, besonders Sauergräser, beherrschen die Flächen. *Carex vesicaria* bildet reine Bestände, desgleichen *C. lasiocarpa* und *Calamagrostis lanceolata*, seltener *C. neglecta*. *Phragmites communis* erscheint bald in Herden, die sich nach dem Flusse hin auch zu kleineren Rohrsümpfen erweitern, bald mehr vereinzelt. *Alopecurus geniculatus*, *A. fulvus*, *Agrostis alba*, *Glyceria fluitans* treten in Gruppen auf, auch *Agrostis canina* ist häufig. *Aira caespitosa* wächst in dichten Bulten, ebenso *Molinia coerulea*. Die Farne vertritt *Aspidium thelypteris*. Gemein sind: *Carex diandra*, *C. stellulata*, *C. Goodenoughii*, *C. panicea*, weniger: *C. elongata* und *C. canescens*. Vielfach sieht man *Eriophorum polystachyum*, *Scirpus palustris*, *Juncus effusus*, gelegentlich *Scheuchzeria palustris*, *Juncus filiformis*. Von Orchideen finden sich *Orchis incarnatus* und *Epipactis palustris*, beide nicht sehr häufig, und in den Randpartien *Orchis maculatus*. Reiche Farbe bringen *Thalictrum flavum*, *Filipendula ulmaria*, *Geranium palustre*, *Lysimachia vulgaris*, *Pedicularis palustris*, *Cirsium palustre*, *Crepis paludosa* in das Bild; im Hochsommer besonders

Gladiolus imbricatus, *Lathyrus paluster* und *Gentiana pneumonanthe*, die letztgenannte bis tief in den Herbst hinein in auffällig hohen Exemplaren; im Frühjahr *Caltha palustris*. Typische Erscheinungen sind weiter: *Lychnis flos cuculi*, *Stellaria graminea*, *Cardamine pratensis*, *Parnassia palustris*, *Epilobium palustre*, *Selinum carvifolia*, *Peucedanum palustre*, *Myosotis palustris*, *Galium uliginosum*, *G. palustre* (weniger), *Valeriana officinalis*, *Succisa pratensis*, an trockenen Stellen auch *Polygonum bistorta*. Kleinere Wasserlöcher sind völlig mit *Calla palustris* oder *Menyanthes trifoliata* ausgefüllt. In Gräben wachsen: *Equisetum heleocharis*, *Typha angustifolia* und seltener *T. latifolia*, *Iris pseud-acorus*, *Rumex hydrolapathum*, *Polygonum amphibium*, *Ranunculus lingua*, *Comarum palustre*, *Lythrum salicaria*, *Cicuta virosa*, *Oenanthe aquatica* (seltener), *Lysimachia thyrsiflora*, *Stachys palustris*, *Mentha aquatica*, *Bidens tripartitus*. Die Wasserflächen in Gräben und Tümpeln liegen unter einer dichten Decke von *Hydrocharis morsus ranae* im Vereine mit *Lemna polyrrhiza*, *L. minor*, *L. trisulca*, gelegentlich auch von *Ranunculus aquatilis*, *Callitriche verna*, *Utricularia vulgaris* und seltener *U. intermedia*. Hilbert stellte auch das Lebermoos *Ricciocarpa natans* fest und fand manche Gräben ganz erfüllt mit *Acrocladium cuspidatum*. Für die Grabenborde sind *Triglochin palustris*, *Stellaria palustris*, *Ranunculus flammula*, *Epilobium hirsutum* und *parviflorum*, *Angelica silvestris*, *Scutellaria galericulata*, *Lycopus europaeus*, *Mentha arvensis*, *Alectorolophus major*, *Inula britannica* charakteristisch, dazu treten auch bessere Futtergräser, wie *Phleum pratense*, *Poa serotina*, *P. pratensis*, *Festuca elatior*. Auf verwundetem Boden erscheint *Senecio paluster*. Hin und wieder erheben sich kleine, kaum fußhohe Höcker, durch *Calluna vulgaris*, *Vaccinium vitis idaea* und *V. uliginosum* gebildet, auf denen gerne *Luzula campestris* (meist in subsp. *multiflora*), *Rumex acetosa*, *Ranunculus acer*, *Potentilla tormentilla*, *Viola palustris*, *Brunella vulgaris* u. a. m. zwischen *Polytrichum commune* wachsen. Hilbert (1917) gibt von Moorzweiden auch *Scirpus caespitosus* und *Carex chordorrhiza* an.

13. Bruchwald.

Im Knie der Schtschara bedeckt ein ausgedehnter Erlen-Birken-Bruchwald viele Quadratkilometer. Er gehört schon dem Poljesje an. Brunnenbohrungen ergaben, daß er auf einer Torfschicht von durchschnittlich etwa 4—6 m Mächtigkeit steht. Leider konnte ich nur die oberste Torflage untersuchen, die einen typischen Bruchwaldtorf darstellt. Der Boden ist das ganze Jahr hindurch sehr feucht und wird periodisch stark überschwemmt. Das Vegetationsbild zeigt Ähnlichkeiten mit dem Erlenfließ. Doch ist im Bruchwald mit seinem weiten Areal eine gewisse Ausgeglichenheit in der Verteilung der Arten unverkennbar, während dort gleichsam die Beengtheit des

Raumes ein wirres Durcheinander im Gefolge hat. Bruchwald tritt auch noch an einigen anderen Stellen im Gebiete auf, doch in weit geringerer Ausdehnung; so z. B. am Nordufer des Wygonoskoje-Sees.

Der Baumbestand ist locker und weist eine ziemlich gleichmäßige Höhe von etwa 15 m auf. An den Rändern werden allerdings erheblich größere Höhen erreicht. Tonangebend ist *Alnus glutinosa*; hinter ihm bleibt der Häufigkeit nach *Betula pubescens* in der Regel etwas zurück, kann aber auch gelegentlich in den Vordergrund treten. Andere Bäume fehlen durchaus, auch die im Erlenfließ nicht seltenen *Picea excelsa* und *Fraxinus excelsior*. Nur nach dem Flusse hin kann *Salix alba* hier und da einen Platz erstreiten.

Sträucher wachsen nur zerstreut. Hauptsächlich sind es Weiden, wie *Salix pentandra*, *S. cinerea*, *S. caprea*, *S. aurita*, seltener *S. nigricans* (auch die Bastarde *S. cinerea* $\times$ *caprea* und *S. cinerea* $\times$ *aurita*), zu denen sich *Frangula alnus*, *Viburnum opulus*, *Rubus idaeus* (in Herden), *R. suberectus*, seltener *Pirus aucuparia* und nach Hilbert auch *Alnus incana* gesellen. Nach dem Rande des Bruchwaldkomplexes und auf Lücken schließen sich die Sträucher mehr zusammen und bilden Dickichte.

In dem dichten und üppigen Bodenwuchs an Gräsern und Kräutern zeigt sich eine gewisse Tendenz zur Herdenbildung. *Phragmites communis* bildet große und dichte Bestände, in geringerem Maße desgleichen *Calamagrostis lanceolata* und auch *Glyceria fluitans*. In Bulten tritt überall *Aira caespitosa* auf; *Poa serotina* ist häufig eingestreut. In Horsten, zwischen Baumwurzeln sitzend, wächst *Carex elongata*, in kleineren Herden *C. lasiocarpa*; gelegentlich sieht man *C. diandra*. An manchen Stellen ist *Urtica dioica* sehr zahlreich. In Scharen erscheinen *Caltha palustris*, *Ranunculus repens*, auch *Polygonum hydropiper*, in mehr lockerer Verteilung *P. minus*. Eine farbenbunte Gesellschaft setzen zur Hauptblütezeit zusammen: *Rumex hydrolapathum*, *Ranunculus lingua*, *Filipendula ulmaria*, *Impatiens noli tangere*, *Lythrum salicaria*, *Lysimachia vulgaris*, *Eupatorium cannabinum* und *Bidens cernuus*, hinter denen *Comarum palustre*, *Lathyrus paluster*, *Stachys palustris*, *Valeriana officinalis* und *Cirsium palustre* an Häufigkeit meist etwas zurücktreten. Hier und dort sind *Epilobium hirsutum*, *Veronica longifolia* und *Senecio paludosus* eingeflochten. Von Doldengewächsen sind *Cicuta virosa* und *Peucedanum palustre* sehr häufig, etwas weniger *Sium latifolium*. An den Baumsockeln machen sich großwedelige Farne breit: *Athyrium filix femina*, *Aspidium thelypteris* und *A. spinulosum*, und zwischen sie zwängt sich *Geranium Robertianum* ein. Hier findet man auch *Chrysosplenium alternifolium*, *Viola palustris* und *Circaea alpina*. Ueberall vertreten sind *Stellaria palustris* und mehr noch *S. graminea* (weniger *S. uliginosa*), *Epilobium palustre*, *Mentha aquatica* und $\times$ *M. verticillata*, *Galium palustre*, seltener *Cardamine amara*.

Solanum dulcamara strebt in die Höhe. Nach dem Flusse hin wird der Untergrund erheblich feuchter. Hier werden *Alisma plantago*, *Iris pseudacorus*, *Nasturtium amphibium*, *Menyanthes trifoliata*, *Symphytum officinale*, *Scutellaria galericulata* und *Lycopus europaeus* besonders häufig, vielfach auch *Calla palustris*. Offene Wasserstellen und Gräben erfüllen zwischen Beständen von *Typha latifolia*, von *T. angustifolia*, von *Sparganium simplex* und seltener *S. ramosum*, von *Phragmites*, von *Acorus calamus* u. a.: *Hydrocharis morsus ranae*, *Lemna polyrrhiza*, *L. minor*, *L. trisulca*, gelegentlich auch *Hottonia palustris* und *Utricularia vulgaris*.

In das Gebiet des Bruchwaldes und in das Poljesje überhaupt kam ich erst Ende August, so daß alle Artenangaben in den diesbezüglichen Kapiteln als lückenhaft angesehen werden müssen. So wächst im Bruchwald zum mindesten sicher noch manche hier nicht genannte Pflanze des „Erlenfließes“ und des „Ufersumpfes“.

An einigen räumlich beschränkten Stellen tritt der unter dem Torflager liegende Sand bis zur Oberfläche heran und trägt anmoorige Wiesen mit *Juncus lampocarpus*, *Lychnis flos cuculi*, *Sagina nodosa*, *Ranunculus flammula*, *Parnassia palustris*, *Gentiana pneumonanthe*, *Myosotis caespitosa*, *Mentha arvensis*, *Galium uliginosum*, *Bidens tripartitus*, *Hieracium umbellatum* und vielen Bruchwaldpflanzen.

Stellenweise erhebt sich der Sanduntergrund auch einige Meter über das Niveau des Bruchwaldes. Hier haben sich kleine Mischwälder aus *Quercus robur*, *Acer platanoides*, *Fraxinus excelsior*, auch *Pinus silvestris*, mit Unterholz aus *Frangula alnus*, *Salix caprea* usw. gebildet, in denen Mischwaldpflanzen wie *Pteridium aquilinum*, *Festuca gigantea*, *Viscaria vulgaris*, *Melampyrum nemorosum*, *Asperula odorata*, *Solidago virga aurea* und Sandpflanzen wie *Helichrysum arenarium* und viele andere wachsen.

An den durch den Bruchwald führenden Wegen und Stegen, fast restlos erst im Kriege als Erde- oder mehr noch als Knüppeldämme gebaut, hat sich ein Pflanzengemisch angesiedelt, das neben bodenständigen auch eingeschleppte Arten umschließt. Hier gedeihen unter anderen:

<i>Poa serotina</i>	<i>Potentilla norvegica</i>	<i>Campanula trachelium</i>
<i>Rumex maritimus</i>	<i>Geranium palustre</i>	<i>Eupatorium cannabinum</i>
<i>Polygonum dumetorum</i>	<i>Epilobium angustifolium</i>	<i>Bidens tripartitus</i>
<i>P. minus</i>	<i>Scutellaria galericulata</i>	<i>B. cernuus</i>
<i>Atriplex patulum</i>	<i>Galeopsis tetrahit</i>	<i>Achillea cartilaginea</i>
<i>Silene dichotoma</i>	<i>G. pubescens</i>	<i>Cirsium arvense</i>
<i>Stellaria aquatica</i>	<i>Lamium maculatum</i>	<i>Sonchus arvensis</i>
<i>Erysimum cheiranthoides</i>	<i>Veronica longifolia</i>	<i>Hieracium umbellatum</i>

14. Waldmoore.

In den Mischwaldkomplexen des ganzen Gebietes, besonders im Fichtenmischwald, trifft man größere und kleinere Moorbildungen an, die teils durch Versumpfung des Waldes entstanden sind, teils auch das Produkt der Verlandung kleiner Weiher darstellen. Soweit sie geringeren Umfang haben, können sie die Bezeichnung „Waldsumpf“ tragen. Es sind zum geringeren Teile Flachmoore vom Typus der Grün- oder Grasmoore; im übrigen stehen sie in dem fortgeschritteneren Stadium der Uebergangsmoore.

I. Flachmoor im Mischwald.

Die Waldflachmoore nehmen in der Regel kleinere Flächen ein. Im Sommer meist begehbar, stehen sie einen erheblichen Teil des Jahres, besonders nach der Schneeschmelze, stark unter Wasser. An Holzpflanzen tragen sie nur Weiden, hauptsächlich *Salix cinerea*, *S. aurita*, *S. repens* und seltener *S. depressa* var. *livida* und von Kleinsträuchern *Vaccinium uliginosum*. Doch ist das Gesträuch für die Physiognomie von minderem Belang. Unter zahlreichen Gräsern und Sauergräsern wachsen viele Kräuter. Im Frühling und ersten Sommer fallen durch ihre Farben besonders *Caltha palustris*, *Iris pseud-acorus*, *Orchis maculatus*, *O. incarnatus*, *Polygonum bistorta*, *Lysimachia thyrsiflora*, *Pedicularis palustris* auf. Späterhin *Rumex crispus*, *Filipendula ulmaria*, *Comarum palustre*, *Lythrum salicaria*, *Epilobium palustre* (sehr häufig), *Cicuta virosa*, *Peucedanum palustre*, *Lysimachia vulgaris*, *Gentiana pneumonanthe*, *Bidens cernuus*, *Cirsium palustre*, *Crepis paludosa* usw. Gelegentlich trifft man *Epipactis palustris* und selten **Malaxis paludosa* an. In Wasserlöchern viel *Calla palustris* und *Menyanthes trifoliata*, an Ausstichen *Senecio paluster*. Wie die Kräuter weisen auch die Gräser viel Uebereinstimmung mit denen der Wiesenmoor-Vegetation auf, doch tritt *Phragmites* ganz zurück. Bemerkenswerte Abweichungen sind dagegen in bezug auf die Sauergräser festzustellen. *Eriophorum* tritt in drei Arten auf: *E. vaginatum* und *E. polystachyum* sehr viel, weniger *E. gracile*. Die Gattung *Carex* weist über 10 Arten auf: *C. diandra*, *C. remota* (am Rande), *C. stellulata*, *C. elongata*, *C. canescens* (auch in var. *subloliacea* Laest.), *C. Goodenoughii*, auch in der Abart *recta*, *C. panicea*, *C. pseudocyperus*, *C. rostrata*, *C. vesicaria* und die interessanten *C. loliacea* und *C. sparsiflora* var. *Gruetteri*. Man trifft *C. loliacea* fast stets in Gesellschaft von *C. canescens*. Für die torfig-sandigen Ränder sind *C. leporina*, *Juncus filiformis*, *J. squarrosus* und *J. alpinus* bezeichnend.

Die Gesamtliste der Waldflachmoore bringt etwa:

Athyrium filix femina sp.
Aspidium thelypteris cop.
A. spinulosum cop.
Phalaris arundinacea sp.

Alopecurus geniculatus cop.
A. fulvus cop.
Agrostis vulgaris sp.
A. alba cop.

- Calamagrostis lanceolata* gr.
Phragmites communis sp.
Poa serotina sp.
Glyceria fluitans cop.
Eriophorum vaginatum cop.
E. polystachyum cop.
E. gracile sp.
Scirpus silvaticus sp.
Carex diandra cop.
C. remota sp.
C. stellulata cop.
C. leporina sp.
C. elongata cop.
C. canescens cop. (auch var. sublo-
 liacea Laest. sp.)
C. loliacea sp.
C. Goodenoughii cop.
C. Goodenoughii var. *recta* sp.
C. panicea sp.
C. sparsiflora var. *Gruetteri* sp.
C. pseudocyperus sp.
C. rostrata gr.
C. vesicaria gr.
Calla palustris sp. gr.
Juncus effusus cop.
J. filiformis sp.
J. squarrosus sp.
J. lampocarpus cop.
J. alpinus cop.
Iris pseud-acorus cop.
Orchis maculatus sp.
O. incarnatus cop.
Epipactis palustris sp.
 * *Malaxis paludosa* sp.
Salix cinerea cop.
S. aurita cop.
S. depressa var. *livida* sp.
- S. repens* cop.
Rumex acetosa sp.
R. crispus cop.
Polygonum bistorta cop.
P. minus sp.
Lychnis flos cuculi cop.
Stellaria uliginosa cop.
S. palustris cop.
S. graminea cop.
Caltha palustris cop.
Ranunculus flammula cop.
R. repens cop.
Chrysosplenium alternifolium gr.
Parnassia palustris cop.
Filipendula ulmaria cop.
Comarum palustre cop.
Viola palustris sp.
Lythrum salicaria cop.
Epilobium palustre cop.
Cicuta virosa cop.
Selinum carvifolia cop.
Peucedanum palustre cop.
Vaccinium uliginosum cop.
Lysimachia thyrsiflora cop.
L. vulgaris cop.
Gentiana pneumonanthe cop.
Menyanthes trifoliata cop.
Myosotis palustris sp.
Lycopus europaeus sp.
Veronica scutellata sp.
Pedicularis palustris cop.
Galium uliginosum cop.
G. palustre sp.
Bidens cernuus sp.
Senecio paluster sp.
Cirsium palustre cop.
Crepis paludosa cop.

Von Moosen sind *Polytrichum*-Arten häufig. *Sphagnum* tritt nur hier und da auf.

II. Uebergangsmoor im Mischwald.

Viele ehemalige Flachmoore des Schtschara-Waldes haben sich dem natürlichen Umwandlungsprozeß der Moore folgend im Laufe der Zeit in Uebergangsmoore umgewandelt. Anderseits scheinen aber auch manche Flächen dieses Stadium unmittelbar aus einer Versumpfung des Waldes heraus erreicht zu haben. Siehe darüber auch unten das Kapitel Sukzessionen.

Dichte *Sphagnum*-Polster überwuchern das Gelände. Es wurden *S. amblyphyllum* var. *parvifolium*, *S. medium*, *S. recurvum*, *S. cymbifolium* festgestellt. In den Randzonen tritt *Polytrichum commune* stark hervor. Zahlreiche *Pinus silvestris* in Kümmerformen, wenige niedrige, krüppelhafte *Betula pubescens* und gelegentlich elende *Picea excelsa* oder *Pirus aucuparia* stehen auf der Fläche. Nach dem Rande hin werden *Frangula alnus* und Weiden: *Salix cinerea*, *S. aurita*, *S. depressa* var. *livida*, *S. lapponum*, *S. repens* (auch in der Abart *rosmarinifolia*), *S. myrtilloides* häufig. Die Halbsträucher *Ledum palustre* und *Vaccinium uliginosum* machen sich überall breit, auch *Andromeda polifolia* ist reichlich vorhanden. In großer Menge überzieht *Vaccinium oxycoccus* die *Sphagnum*-Polster und auf Bulten, mit denen das Gelände dicht besät ist, wachsen viel *Vaccinium vitis idaea*, wenig *Calluna vulgaris* und noch weniger *Vaccinium myrtillus*. Der Hauptbultenbildner ist *Eriophorum vaginatum*. In viel geringerer Zahl, aber doch häufig, zeigen sich *E. polystachyum* und *E. gracile*. Die Gattung *Carex* ist auch in den Uebergangsmooren reich vertreten. *C. rostrata*, ebenso *C. vesicaria* und *C. lasiocarpa* bilden reine Bestände, nach dem Rande hin stehen kleinere Flecken der zierlichen **C. tenella*. Allenthalben zeigen sich *C. steliulata*, *C. elongata*, *C. canescens* und *C. Goodenoughii*; die letztgenannte oft in der durch ihre Größe auffallenden Abart *recta*. Nicht selten ist auch *C. sparsiflora* var. *Gruetteri*; dagegen wächst *C. loliacea* fast nur in den Fichtenbeständen der Randzone. Von Gräsern ist nur *Calamagrostis lanceolata* zahlreich und, wenn auch in einigem Abstände, *Agrostis canina*. Kleinere Vertiefungen werden von *Calla palustris*, *Menyanthes trifoliata* und in geringerem Maße von *Lysimachia thyrsiflora* ausgefüllt. Im *Sphagnum* findet man viel *Drosera rotundifolia*, viel *Viola palustris* und weniger **V. epipsila*, ferner *Ranunculus flammula*, *Epilobium palustre*, *Veronica scutellata* und *Pedicularis palustris*. Mehr nach den Rändern hin erscheinen *Athyrium filix femina*, *Aspidium cristatum*, *Comarum palustre*, *Selinum carvifolia*, *Peucedanum palustre*, *Lysimachia vulgaris* u. a. m.

Die Berandung der im Fichten-Mischwald gelegenen Uebergangsmoore weist öfter reine Bestände von gut entwickelten *Picea excelsa* auf, deren Unterwuchs und Bodenflora durch besonders interessante Elemente ausgezeichnet sind. In diesen „Fichtenreichen Randzonen der Waldübergangsmoore“ ist der Boden mit einem dichten Teppich von *Polytrichum*, *Hylocomium* usw., weniger von Torfmoosen bedeckt und darauf gedeihen: kleine Rasen von **Carex tenella*, Horste von *C. loliacea*, desgleichen von *C. sparsiflora* var. *Gruetteri*, dazu *Carex remota*, *C. canescens*, *C. lasiocarpa* und andere Seggen mehr, *Majanthemum bifolium*, *Listera cordata*, *Stellaria Friesiana*, *Circaea alpina*, *Pirola uniflora*, *Trientalis europaea* usw.; von Gefäßkryptogamen: *Aspidium spinulosum*, *Equisetum silvaticum* und ebenso *E. pratense* in Herden, hin und wieder

auch *Lycopodium selago*; wuchernde Polster von *Agrostis alba* var. *stolonifera*. Das lockere Unterholz bilden *Salix livida*, *S. lapponum*, *S. myrtilloides* und kräftige *Frangula alnus*-Sträucher. Darüber sind ansehnliche Fichten gestellt. Im ganzen ist es das Vegetationsbild eines Moorwaldes, der zwischen einem Flachmoorwald und einem Uebergangsmoorwald stehend dem letzten etwas mehr zuneigt.

Auf manchen Waldmooren findet man reine Bestände von *Ledum*, mitunter auch von *Vaccinium uliginosum*, und gelegentlich ziehen sich solche Bestände auch noch ein gutes Stück in den umgebenden Wald hinein.

Bei gewissen kleineren Kesselmooren, die nach der Schneeschmelze unter Wasser zu stehen pflegen, bezeichnet *Juncus effusus* eine gut ausgeprägte Randzone, während *J. Leersii* für austrocknende Moorflächen charakteristisch ist.

15. Weiden-Strauchmoor.

Durchquert man das Tal der Schtschara westlich der Einmündung des Oginski-Kanals, so fällt ein außerordentlicher Gegensatz zwischen den Gehölzbildungen, die den breiten Talwiesengrund im Norden und im Süden umsäumen, ins Auge. Nördlich der oben beschriebene Erlen-Moorbirken-Bruchwald und südlich ein Strauchmoor, dem Weidengebüsche in reichster Entwicklung den Charakter geben. Aus dem Wiesenmoor der Talaue sich schnell entwickelnd trennt das „Weiden-Strauchmoor“ in einem mehrere Kilometer langen und einige hundert Meter breiten Bande den Talgrund von einem in der bekannten, oft einem Uhrglase verglichenen Form sich erhebenden weiten Hochmoorgelände. Weiter nach Westen hin geht es in einen „Birken-Moorwald“ über.¹⁾ Bei hohem Wasserstande wird es periodisch mehr oder weniger überflutet. Nach seiner Artenliste ist das Weiden-Strauchmoor ebenso wie nach seinem ganzen Aufbau zum Typus des Flachmoores zu rechnen.

Höhere Bäume sind wenig vertreten, um so dichter ist das Gesträuch. Hauptsächlich *Salix cinerea* und *S. aurita*, weiter *S. pentandra* und auch wohl *S. alba*, häufig *Frangula alnus*, *Viburnum opulus*, *Betula pubescens*, *Alnus glutinosa* und seltener *Rhamnus cathartica*, auch *Pirus aucuparia*.

Die Farne sind durch *Athyrium filix femina* und *Aspidium thelypteris* reich vertreten, nach dem angrenzenden Hochmoore hin auch durch *A. cristatum*. *Phragmites communis*, ebenso *Calamagrostis lanceolata* bilden zwischen den Sträuchern Bestände. Ueberall ist *Poa serotina* eingestreut. Von Sauergräsern konnte ich nur noch *Carex lasiocarpa* feststellen. Hochwüchsige Kräuter in reicher Individuenzahl: *Iris pseud-acorus*, *Urtica dioica*, *Rumex hydrolapathum*,

¹⁾ Ueber die räumlichen Zusammenhänge der einzelnen Mooregebiete des Poljesje siehe die Kartenskizze 2, über die zeitlichen das Kapitel „Sukzessionen“.

Ranunculus lingua, *Thalictrum flavum*, *Filipendula ulmaria*, *Impatiens noli tangere*, *Lythrum salicaria*, *Cicuta virosa*, *Angelica silvestris*, *Peucedanum palustre*, *Lysimachia vulgaris*, *Stachys palustris*, *Veronica longifolia*, *Valeriana officinalis*, *Eupatorium cannabinum*, *Bidens cernuus*, *Achillea ptarmica*, *Senecio paludosus*. Dazwischen überall die kleineren: *Lychnis flos cuculi*, *Stellaria palustris*, *Ranunculus repens*, *Parnassia palustris*, *Comarum palustre*, *Geranium Robertianum*, *Epilobium palustre*, *Myosotis palustris*, *Scutellaria galericulata*, *×Mentha verticillata*, *Veronica scutellata*. An feuchteren Stellen Bestände von *Glyceria aquatica*, von *G. fluitans* und von *Menyanthes trifoliata*. *Gentiana pneumonanthe* wird über 1,20 m hoch; *Solanum dulcamara* rankt sich durch das Gebüsch; *Cuscuta europaea* schmarotzt auf *Urtica* und anderen. An Wegen sind *Galeopsis pubescens* und *Cirsium arvense* eingeschleppt.

16. Birken-Moorwald.

Aus Wiesenmoor, wohl über das Zwischen-Stadium eines Wiesen-Strauchmoores hinweg, ist der Birken-Moorwald entstanden. Er bildet in dem südlich der Schtschara beginnenden Poljesje recht große Waldkomplexe mit reinem *Betula pubescens*-Baumbestand auf Torfboden. Ich konnte eine, ziemlich nahe der Oberfläche entnommene Torfprobe von Professor C. A. Weber (Bremen) untersuchen lassen, der mir darüber schreibt:

„Eine Torfmudde mit mäßiger Beimengung staubfreien Quarzsandes, reichlich durchzogen mit Wurzeln und dünnen Rhizomen von *Carex* sp. Ausgeschlämmt wurden die Nüsse von *Carex* sect. *Carex* in Menge, wahrscheinlich alle von *C. rostrata*, von der sich einige wohl erhaltene Bälge fanden, ferner in sehr großer Menge die Bälge von *Carex chordorrhiza* und zahlreiche Nüsse von *Carex* sect. *Vignea*, wahrscheinlich von *C. acuta*. Ferner wurden angetroffen einige Früchte von *Ranunculus lingua* und *R. flammula*, eine Fruchtschuppe von *Betula pubescens*, mehrere Cocons von *Oligochaeten*, einige Rhizopodengehäuse, einige Larvenhüllen von Dipteren und eine Flügeldecke eines kleinen Käfers. Die mikroskopische Untersuchung ergab in geringer Menge Blütenstaubkörner, meist von *Pinus silvestris*, spärlicher von *Quercus*, *Carpinus*, *Betula*, *Salix*, Gramineen und *Nymphaea alba*, ferner auch in geringer Menge die Kieselschalen von *Navicula oblonga* var. *lanceolata* Grun., *Squedra* sp. (nur einmal ein Bruchstück), einige Sporen von *Sphagnum*, endlich einige zerbrochene Nadeln von *Spongilla lacustris* nebst einigen *Gladoceren*häuten, ziemlich reichlich *Epidermis* von Gramineen. Als diese Torfmudde entstand, war kein Birkenwald vorhanden, sondern ein von flachen Wasserlachen durchzogener Seggensumpf.“

Die Stelle, an der die Torfprobe aufgenommen wurde, liegt etwa 1,5 km von der Schtschara entfernt. Der nach dem Flusse hin gelegene Teil des

Birken-Moorwaldes kommt bei den periodischen Ueberschwemmungen unter Wasser. Er erinnert in manchen Stücken an den Bruchwald des nördlichen Ufers, ist aber zur Sommerszeit erheblich trockener und weit reicher an niederem und mittelhohem Gehälm, während die Kräuter recht zurücktreten (auffallend zahlreich war *Epilobium palustre*). Soweit ich bei der vorgerückten Jahreszeit ersehen konnte, finden sich nur Flachmoortypen. *Sphagnum* ist in diesem Teile des Waldes so gut wie gar nicht vorhanden. Alles in allem also ein Birken-Moorwald von ausgesprochenem Flachmoortypus. *Betula pubescens* ist alleiniger Baum. Auf seinen Wurzelhöckern wachsen reichlich Farne. Unterholz ist spärlich, nur einzelne junge *Betula pubescens*, dürrtige *Frangula alnus* und in etwas größerer Zahl Weidensträucher. Daß hier die Erle vollkommen fehlt, während sie auf der anderen Flußseite vorherrscht, liegt an den ungünstigeren edaphischen Verhältnissen. Die Ueberschwemmungen sind hier weit weniger intensiv als drüben und infolgedessen die Versorgung des Bodens mit Sauerstoff und mineralischen Nährstoffen weit geringer. Und darin ist die Erle weit empfindlicher als die Moorbirke.

Weiter nach Süden hin ändert sich das Waldbild. Das Unterholz wird dichter, der Baumbestand weit lockerer, um sich schließlich mehr und mehr aufzulösen. *Sphagnum* zeigt sich erst in vereinzelt Flecken und schließt sich dann zu immer größeren Decken zusammen. Der Birkenmoorwald ist hier von ausgesprochenem Uebergangsmoortypus und wird weiterhin allmählich zum Birken-Strauchmoor.

Erwähnt sei noch, daß auf einer etwa einen Quadratkilometer großen Fläche ein Windbruch den Birkenwald verwüstet hatte. Die flachwurzelnden Birken waren wirt durcheinandergeworfen und gaben mit ihren weit aufragenden Wurzelballen ein eindrucksvolles Bild der Zerstörung. Diese Wirt war ein besonders beliebter Zufluchtsort der Elche, die in den weiten Birkenstrauchmooren, den Birkenmoorwäldern und dem Bruchwald in ruhigen Zeiten so recht zu Hause sind.

17. Birken-Strauchmoor.

Westlich des Wygonoskojesees dehnen sich gewaltige Flächen eines Strauchmoores aus. Größere und kleinere Strauchpartien wechseln mit gras- und krautreichen Blößen in dichter Würfelung ab. In der Bodenschicht spielt *Sphagnum* eine wichtige Rolle, bildet jedoch keinen geschlossenen Teppich.

Das Gebüsch wird in der Hauptsache von niedrigen, nur zuweilen kümmerlich baumförmigen *Betula pubescens* gebildet mit reichlicher Einsprengung von *Frangula alnus* und Weiden: *Salix pentandra*, *S. cinerea*, *S. aurita*, *S. repens* (in den Formen *eurepens* und mehr noch *rosmarinifolia*),

S. myrtilloides und auffällig viel *S. lapponum* (auch der seltene Bastard *S. repens* × *lapponum* in der Form *sublapponum*). *Betula humilis* tritt nur hier und da auf.

Von Farnen sieht man reichlich *Athyrium filix femina*, *Aspidium thelypteris*, *A. spinulosum* und besonders *A. cristatum*. Von Gräsern konnte ich noch *Agrostis canina* und die massenhaft auftretenden *Calamagrostis lanceolata*, *C. neglecta*, *Molinia coerulea* feststellen; *Phragmites* ist mehr vereinzelt; von Wollgräsern *Eriophorum vaginatum* und *E. polystachyum*, von Seggen *Carex chordorrhiza*, *C. diandra*, *C. Goodenoughii*, *C. lasiocarpa* und *C. rostrata*. Weiter *Lychnis flos cuculi*, *Stellaria palustris*, *Parnassia palustris*, *Galium uliginosum*; die hochwüchsigen: *Lythrum salicaria*, *Cicuta virosa* (meist in der Abart *angustifolia*), *Angelica silvestris*, *Peucedanum palustre*, *Lysimachia vulgaris*, *Symphytum officinale*, *Veronica longifolia*, *Valeriana officinalis*, *Senecio paludosus*, *Hieracium umbellatum*. *L. sp. umbellatum* (L.) Zahn var. *genuinum* Griseb.; dazu *Rumex acetosa*, *Comarum palustre*, *Epilobium palustre*, *Scutellaria galericulata*, *Lycopus europaeus*, *Mentha arvensis*. Ganz auffällig hoch wird auch hier wieder *Gentiana pneumonanthe*. An nassen Stellen: *Caltha palustris*, *Ranunculus flammula*, *Lysimachia thyrsiflora* und *Menyanthes trifoliata*. Wo das *Sphagnum* stärker hervortritt: *Scheuchzeria palustris*, *Drosera rotundifolia*, *Andromeda polifolia* und *Vaccinium oxycoccus*. Auch *Ledum* bevorzugt solche Stellen.

Das Birken-Strauchmoor ist eine typische Poljesje-Landschaft. Die Vermischung der Flachmoortypen mit dem *Sphagnum* und seinen Trabanten drücken ihm den Stempel des „Uebergangsmoores“ auf. Nach seiner leichten Begehrbarkeit rechnet es zu den „Stand“-Uebergangsmooren, nach der physiognomischen Bedeutsamkeit der Sträucher zu den „Reiser“-Uebergangsmooren. Im ganzen steht es dem Flachmoor-Typus näher als dem des Hochmoores. In Friedenszeiten wird ein Teil dieser Strauchmoor-Flächen sicherlich der Weide- oder Heunutzung unterworfen, wie das jetzt auch durch die Sol-
daten in erheblichem Maße geschah.

18. Chamaedaphne-Hochmoor.

Das interessanteste Mooregebilde in dem besuchten Teile des Poljesje ist ein Hochmoor, zwischen dem Wygonoskoje-See und der Schtschara in einer Ausdehnung von mehreren Quadratkilometern gelegen. Im Norden grenzt es an das Weiden-Strauchmoor, im Westen an Birken-Moorwald und Birken-Strauchmoor, im Süden an letztgenanntes und an den See, von dem es nur durch einen schmalen Kiefern-Erlen-Streifen (siehe oben p. 42) getrennt wird. Der Ost-Teil des Moores, das durch den die Front bildenden Oginski-Kanal mitten durchschnitten wird, war mir unzugänglich.

Es handelt sich um typisches Hochmoorgelände, das sich uhrglasförmig über das umliegende Terrain um etwa 1 m erhebt und daher durchaus frei von Ueberschwemmungen bleibt. Die Höenschichtlinie der Karte (siehe Skizze 2) gibt geradezu den Umriß des Hochmoores an. Der Boden wird von einem *Spagnum-Eriophorum vaginatum*-Torf gebildet, der wie ein vollgesogener Schwamm daliegt und schwer zu begehen ist. Die eigentliche Hochmoorfläche steht in einem außerordentlichen physiognomischen Gegensatz zu ihrer Umgebung, sowohl zu den Strauchmoor- wie zu den Waldmoor-Partien. Die *Sphagnum*-Masse mit ihrem ins Bräunliche spielenden dunklen Grün gibt den Farbenton an. Sträucher fehlen durchaus. Dagegen sind Kleinsträucher in großer Menge vorhanden. *Ledum palustre* und **Chamaedaphne calyculata* streiten um den Vorrang. Beide sind sehr häufig. Doch ist die letztgenannte mit ihren helleren Farbentönen für die Physiognomie des Geländes bedeutender. Ihre flachbelaubten, wie gepreßt erscheinenden Zweige mit den silberigen Blättern gewähren einen auffälligen Gegensatz gegen die dunkelgrünen, zerfahrenblättrigen *Ledum*-Stengel. Als ich diese Gegend im Spätsommer kennen lernte, stand *Chamaedaphne* in schöner zweiter Blüte. Gegen die beiden vorgenannten tritt *Andromeda polifolia* an Individuenzahl stark zurück, ist aber doch reichlich vorhanden. Sie fällt besonders durch eine häufig auftretende, rötlich leuchtende Verpilzung auf, die in geringerem Grade auch bei *Chamaedaphne* zu beobachten ist. Der vierte Genosse aus der Ericaceen-Sippe, der Zwergstrauch *Vaccinium oxycoccus*, überspannt mit seinen feinen Stengeln die ganze Fläche. Von Krautpflanzen waren nur noch *Drosera rotundifolia* und *Eriophorum vaginatum*, beide in großer Zahl, zu sehen. Das Wollgras bildet starke Bulten und läßt die ganze Fläche von dicken Buckeln wie besät erscheinen. Darüber erheben sich in ganz lockerem, weitmaschigem Bestande mittelhohe, im Durchschnitt etwa 15 m Höhe erreichende Bäume von *Pinus silvestris*. Diese Erscheinung, ebenso wie der Reichtum an wohlentwickelten Kleinsträuchern¹⁾ auf einem nach Bodenform und Bodenart typischen und durchaus lebenskräftigen Hochmoor ist sehr auffällig.

Für die Bildung und Entwicklung dieses Moorgebildes ist das Resultat der Untersuchung einer in etwa $\frac{1}{2}$ m. Tiefe entnommenen Torfprobe durch C. A. Weber von Bedeutung: „Es ist ein jüngerer *Sphagnum*-Torf, der in den beiden Stücken der Probe ausschließlich aus *Sphagnum medium* Limpr. mit ziemlich viel *Eriophorum vaginatum* bestand. Einige abgestorbenen Wurzeln von *Pinus silvestris*, ein Nadelpaar derselben Art und einige Blätter von *Vaccinium oxycoccus* waren vorhanden. Letztere klebten dem einen Stücke von außen an und sind vielleicht nicht fossil.

¹⁾ Groß (1912) gibt vom Großen Moorbruch in Ostpreußen an, daß *Chamaedaphne* auf der eigentlichen Hochmoorfläche nur kümmerlich entwickelt ist.

Samen oder Früchte waren in dem Torf nicht vorhanden, Blütenstaubkörner ziemlich reichlich, und zwar ganz überwiegend von *Pinus silvestris*, vereinzelt von *Picea excelsa*, *Alnus* und *Betula*, ferner ziemlich spärlich solche von Cyperaceen oder Gramineen. Auffallend ist das Fehlen von Blütenstaubkörnern von Ericaceen. Die jetzt auf dem Moore vorhandenen scheinen sich erst später angesiedelt zu haben.“

Man hat es demnach, alles in allem betrachtet, mit einem in Regression befindlichen Hochmoore zu tun. Weiteres darüber unten im Kapitel „Sukzessionen“.

Dieses durch *Chamaedaphne* pflanzengeographisch ebenso wie physiognomisch gekennzeichnete „*Chamaedaphne*-Hochmoor“ geht in seine Nachbar-Moorgebilde nicht unvermittelt über. Nach dem Kiefern-Erlen-Uferstreifen hin wird der Kiefernbestand erheblich dichter, wobei die Bäume kleiner und dürrtiger werden, um erst in dem Uferstreifen selbst wieder zu normaler Entwicklung zu kommen. Die Randzone nach dem Moorwalde und den Strauchmooren zu weist eine Artenzunahme auf. Von Sträuchern erscheinen *Salix lapponum*, *S. repens* var. *rosmarinifolia*, *S. myrtilloides*, dazu *Betula pubescens*; von Krautpflanzen u. a. *Scheuchzeria palustris*, *Eriophorum polystachyum*, *Carex lasiocarpa*, *Comarum palustre*, *Epilobium palustre*, *Lysimachia thyrsoflora*, *Menyanthes trifoliata*; sehr häufig wird *Aspidium cristatum*; mehr vereinzelt sind *Equisetum heleocharis* und *Phragmites communis*.

Längs der von den Soldaten zahlreich angelegten Holzstege hatte sich *Polygonum minus* in großer Zahl eingefunden und gedieh auf dem *Sphagnum* auffallend gut.

19. Ackerrain-Gemeinschaft.

Auf den Rainen zwischen den Aeckern und an den Wegen findet man eine Vereinigung von Pflanzen, die teils den natürlichen Beständen des Gebietes entstammen, teils Kulturbegleiter sind, eine Gemeinschaft von Arten mit großem Lichtbedürfnis und der Fähigkeit, auch eine verhältnismäßig hohe Trockenheit zu ertragen.

Von Kryptogamen sieht man gelegentlich *Pteridium aquilinum* und häufig *Equisetum arvense*. Gräser sind stark vertreten; bezeichnend sind u. a. *Phleum pratense* var. *nodosum*, *Holcus lanatus*, *Poa annua*, *Lolium perenne*. Die Sauergräser haben hier nur *Carex hirta* aufzuweisen. Im übrigen herrschen Leguminosen und Kompositen vor. Unter ihnen sind bemerkenswert: *Trifolium strepens* (sehr häufig), *T. spadicum*, *Astragalus arenarius*, *Anthemis tinctoria*, *Chrysanthemum vulgare* und das seltene *Cichorium intybus*. *Taraxacum officinale* fehlt, wie überhaupt eine ganze Reihe der in Deutschland an solchen Standorten häufigen Arten vermißt werden. *Echium vulgare* variiert

öfter von Blau über Rosa bis Weiß. Erwähnt seien noch die nicht gerade häufigen *Silene armeria*, *Arabis arenosa* und *Berteroa incana*. Trotz mancher schönblütigen Arten wie *Malva alcea*, *Erythraea centaurium*, *Verbascum phlomoides* und anderen machen die Raine doch nie den bunten, vollblumigen Eindruck wie so oft in Deutschland.

Im ganzen wurden festgestellt:

Pteridium aquilinum sp.
Equisetum arvense cop.
Phleum pratense var. *nodosum* cop.
Agrostis vulgaris cop.
Apera spica venti cop.
Holcus lanatus cop.
Dactylis glomerata sp.
Poa annua cop.
P. pratensis cop. (auch in var. *angustifolia*)
Bromus secalinus sp.
Lolium perenne cop.
Triticum repens sp.
Carex hirta cop.
Rumex acetosella cop.
Polygonum aviculare cop.
Silene inflata cop.
S. armeria sp.
Melandryum album cop.
Fumaria officinalis sp.
Arabis arenosa sp.
Erysimum cheiranthoides sp.
Berteroa incana sp.
Sedum maximum sp.
Fragaria vesca cop.
Potentilla argentea (in mehreren Formen) cop.
P. collina sp.
P. anserina cop.
Agrimonia eupatoria sp.
Medicago lupulina var. *Willdenowii* sp.
Trifolium procumbens sp.
T. strepens cop.
T. spadicum sp.
T. hybridum cop.
Lotus corniculatus sp.
Astragalus arenarius sp.
Coronilla varia sp.
Vicia angustifolia sp.

V. hirsuta sp.
Malva alcea sp.
Hypericum perforatum cop.
Torilis anthriscus sp.
Pimpinella saxifraga cop.
Carum carvi sp.
Anagallis arvensis sp.
Erythraea centaurium sp.
Anchusa officinalis cop.
Myosotis intermedia sp.
Echium vulgare cop.
Ajuga genevensis sp.
Brunella vulgaris cop.
Galeopsis ladanum sp.
Verbascum phlomoides sp.
Linaria vulgaris cop.
Euphrasia stricta sp.
Odontites verna sp.
Alectorolophus major cop.
Galium verum sp.
G. mollugo sp.
Knautia arvensis cop.
Erigeron acer sp.
Anthemis tinctoria sp.
A. arvensis sp.
Achillea millefolium cop.
Chrysanthemum vulgare sp.
Artemisia campestris cop.
Senecio jacobaea sp.
Centaurea jacea cop.
C. cyanus cop.
C. scabiosa sp.
Cichorium intybus sp.
Leontodon autumnalis cop.
Hieracium pilosella ssp. *impexum*.
 Zahn cop.
H. florentinum ssp. *aquilonare* (N. P.)
 Zahn sp.
H. umbellatum sp.

20. Brachäcker-Flora.

In dem von der Zivilbevölkerung restlos geräumten Gebiete war zwar ein Teil der Aecker von unseren Soldaten bestellt, doch lagen, besonders dicht an der Front, viele Felder, oft in großen zusammenhängenden Flächen, unbebaut. Als ich diese Brachäcker kennen lernte, war es der zweite Sommer, daß sie sich selbst überlassen dalagen. Schon diese kurze Zeit hatte eine erstaunliche Veränderung hervorgerufen. Von den früheren Kulturpflanzen konnte man kaum noch Spuren entdecken. Die Ackerunkräuter, die bei der wenig rationellen Bebauungsweise des Landes schon zu Friedenszeiten eine allzu große Rolle gespielt hatten, waren übermächtig geworden. Doch machten ihnen die Arten aus den benachbarten Naturbeständen schon sehr kräftige Konkurrenz. Einige Beispiele von allgemeinerer Bedeutung seien geschildert.

Zunächst ein Brachland von geringerer Ausdehnung, auf ziemlich feuchtem Boden inmitten eines Waldkomplexes gelegen. Einige ganz vereinzelt Halme von *Secale cereale* deuteten auf die frühere Bestellung hin. Auffällig war das stellenweise massenhafte Auftreten von *Equisetum silvaticum* neben *E. arvense*. Vom Waldrande her waren *Vicia cassubica* und *Epilobium montanum* eingewandert. *Trifolium strepens* in leuchtendem Goldgelb und *T. spadicum* in dunkeltem Braun belebten das Bild. An feuchten Stellen, besonders in Furchen, wuchsen: *Rumex acetosa*, *Polygonum hydropiper*, *P. tomentosum*, *Ranunculus flammula*, *Angelica silvestris*, *Lysimachia vulgaris*, *Stachys palustris*, *Mentha arvensis*, *Sonchus arvensis* und dazwischen die Zwerge: *Gypsophila muralis*, *Sagina procumbens*, *Herniaria glabra* var. *puberula*, *Sceleranthus annuus*, *Radiola linoides*, *Hypericum humifusum*, *Anagallis arvensis*, *Plantago major* var. *nana*, *Filago minima*. Von Gräsern fanden sich: *Agrostis alba*, *Apera spica venti*, *Holcus lanatus*, *Bromus secalinus*, *Triticum repens*. Weiter waren häufig: *Rumex acetosella*, *Cerastium triviale*, *Trifolium repens*, *Hypericum perforatum*, *Convolvulus arvensis*, *Brunella vulgaris*, *Alectorolophus major*, *Erigeron canadensis*, *Achillea millefolium*, *Chrysanthemum leucanthemum*, *Centaurea cyanus* und mehr zerstreut: *Agrostemma githago*, *Trifolium hybridum*, *T. pratense*, *Vicia cracca*, *V. hirsuta*, *Pimpinella saxifraga*, *Myosotis intermedia*, *Galeopsis tetrahit*, *G. pubescens*, *G. speciosa*, *Thymus serpyllum*, *Euphrasia stricta*, *Odontites verna*, *Campanula patula*, *C. rapunculoides*. Erwähnenswert ist noch *Cerastium glomeratum*.

Ein anderes von Wald umgebenes, weit trockeneres Brachgelände, das sich in großer Ausdehnung über einen Hügel hinweg zog, war durch massenhaftes Auftreten von *Rumex acetosella*, *Erigeron canadensis*, *Artemisia campestris* und (nach dem Walde hin) *Pteridium aquilinum* ausgezeichnet. Stellenweise war auch *Erythraea centaurium* sehr häufig, ebenso *Galeopsis ladanum* (die Form *G. intermedia* Vill.). Auffällig war, wie auch sonst im Gebiet, das

Auftreten von *Stellaria graminea* in kräftiger Entwicklung an ganz trockenen Stellen. Im ganzen wurden auf dieser Brache beobachtet:

<i>Pteridium aquilinum</i> cop.	<i>Pimpinella saxifraga</i> cop.
<i>Equisetum arvense</i> cop.	<i>Carum carvi</i> sp.
<i>Phleum pratense</i> sp. (auch in var. nodosum)	<i>Erythraea centaurium</i> cop.
<i>Agrostis vulgaris</i> cop.	<i>Convolvulus arvensis</i> cop.
<i>A. alba</i> sp.	<i>Myosotis arenaria</i> cop.
<i>Poa trivialis</i> sp.	<i>M. intermedia</i> sp.
<i>P. pratensis</i> sp.	<i>Brunella vulgaris</i> cop.
<i>Rumex acetosella</i> cop.	<i>Galeopsis ladanum</i> subsp. intermedia cop.
<i>Polygonum aviculare</i> cop.	<i>Linaria vulgaris</i> sp.
<i>Silene inflata</i> cop.	<i>Veronica serpyllifolia</i> sp.
<i>Gypsophila muralis</i> sp.	<i>Alectorolophus major</i> sp.
<i>Stellaria graminea</i> sp.	<i>Plantago media</i> sp.
<i>Cerastium triviale</i> cop.	<i>Galium verum</i> sp.
<i>Spergularia rubra</i> sp.	<i>G. mollugo</i> sp.
<i>Herniaria glabra</i> var. <i>puberula</i> cop.	<i>Campanula rapunculoides</i> sp.
<i>Delphinium consolida</i> sp.	<i>Jasione montana</i> cop.
<i>Papaver argemone</i> sol.	<i>Erigeron acer</i> sp.
<i>Teesdalea nudicaulis</i> cop.	<i>E. canadensis</i> cop.
<i>Raphanus raphanistrum</i> sp.	<i>Filago arvensis</i> sp.
<i>Draba verna</i> cop.	<i>Gnaphalium silvaticum</i> cop.
<i>Stenophragma Thalianum</i> cop.	<i>Achillea millefolium</i> cop.
<i>Potentilla argentea</i> sp.	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> cop.
<i>P. norvegica</i> sp.	<i>Artemisia campestris</i> cop.
<i>Trifolium strepens</i> cop.	<i>Centaurea jacea</i> cop.
<i>T. repens</i> cop.	<i>C. cyanus</i> cop.
<i>T. arvense</i> cop.	<i>C. scabiosa</i> sp.
<i>T. pratense</i> sp.	<i>Leontodon autumnalis</i> cop.
<i>Ornithopus sativus</i> sp.	<i>Crepis biennis</i> sp.
<i>Coronilla varia</i> sp.	<i>C. tectorum</i> sp.
<i>Vicia angustifolia</i> sp.	<i>Hieracium pilosella</i> subsp. <i>impexum</i>
<i>V. cassubica</i> sp.	<i>Zahn</i> cop.
<i>V. cracca</i> sp.	<i>H. auricula</i> subsp. <i>littuanicum</i>
<i>V. villosa</i> sp.	<i>N. P.</i> sp.
<i>Hypericum perforatum</i> cop.	<i>H. floribundum</i> sp.
<i>H. humifusum</i> sp.	<i>H. umbellatum</i> sp.
<i>Viola tricolor</i> cop. (meist in var. <i>arvensis</i>)	

Ein, teils an Wald, teils an Heide angrenzendes, Brachstück größeren Umfangs war dadurch bemerkenswert, daß es in seinen verschiedenen Teilen ganz verschiedene Leitpflanzen hatte. So waren teils *Melandryum album*, teils *Hypericum perforatum*, teils *Erigeron canadensis*, teils *Gnaphalium silvaticum*,

teils *Achillea millefolium* und besonders *Artemisia campestris* tonangebend. Sehr auffällig machte sich in der Nähe des Waldrandes das massenhafte Auftreten von jungen, schnellwüchsigen Holzpflanzen; bald bildeten junge *Betula pubescens*, bald junge *Populus tremula* ganze Bestände. Erwägung mögen noch das häufige Vorkommen von *Thymus chamaedrys*, während *T. serpyllum* fehlte, und das Erscheinen von *Epilobium collinum* auf kurzgrasigen Stellen finden.

Schließlich sei noch eine Brachfläche besprochen, die dicht bei einem Dorfe lag, und diesen Umstand durch das massenhafte Vorhandensein typischer Anthropochoren wie *Anthemis cotula*, *Matricaria chamomilla*, *Artemisia absinthium* u. a. m. zum Ausdruck brachte. Von einem benachbarten Sandfelde waren *Corynephorus canescens*, *Silene armeria*, *Peucedanum oreoselinum*, *Verbascum thapsus* und viel *V. phlomoides*, *Veronica Dillenii*, *Helichrysum arenarium* u. a. eingewandert, von einem Frontbahn-Damm *Oenothera biennis*. Dazu traten viele der schon genannten Brachäckerpflanzen und folgende von Brachen bisher nicht erwähnte:

Panicum crus galli
Setaria glauca
Triticum repens var. *caesium*
Polygonum convolvulus
Spergula arvensis
Scleranthus perennis
Sisymbrium sophia
Capsella bursa pastoris
Melilotus officinalis
Trifolium procumbens
Lotus corniculatus
Erodium cicutarium
Epilobium angustifolium
Anthriscus silvestris
Anchusa officinalis

Lycopsis arvensis
Lithospermum arvense
Calamintha acinos
Thymus serpyllum
Veronica arvensis
Plantago lanceolata
Knautia arvensis
Anthemis tinctoria
A. arvensis
Matricaria inodora
Artemisia vulgaris
Senecio vernalis
Cirsium arvense
Cichorium intybus (selten)
Hypochoeris radicata

Auf jeder Brache fanden sich häufig: *Equisetum arvense*, *Rumex acetosella*, *Cerastium triviale*, *Herniaria glabra* var. *puberula*, *Trifolium repens*, *Hypericum perforatum*, *Convolvulus arvensis*, *Brunella vulgaris*, *Alectorolophus major*, *Erigeron canadensis*, *Achillea millefolium*, *Chrysanthemum leucanthemum*, *Artemisia campestris* (in trockenem Gelände), *Centaurea cyanus*; im Frühjahr überall: *Teesdalea nudicaulis*, *Draba verna*, *Stenophragma Thalianum*.

Hilbert stellte am Rande einer sandigen Brache unter Kiefern auch *Melandryum noctiflorum* fest.

21. Unkrautflora bebauter Aecker.

Wo es irgend anging, wurde hinter der Front das Feld bestellt. Trotz aller aufgewandten Mühe blieb die Verunkrautung eine recht starke. Was ich an Unkräutern fand, war wohl fast alles bodenständig und nicht erst mit dem von der Heeresverwaltung gelieferten Saatgut eingeschleppt.

Auf trockenen sandigen Aeckern fanden sich unter Getreide:

<i>Equisetum arvense</i>	<i>Viola tricolor</i>
<i>Panicum lineare</i>	<i>Anagallis arvensis</i>
<i>Setaria glauca</i>	<i>Anchusa officinalis</i> (mitunter in
<i>Agrostis alba</i>	Massen)
<i>Apera spica venti</i>	<i>Lycopsis arvensis</i>
<i>Bromus secalinus</i>	<i>Myosotis arenaria</i>
<i>Lolium perenne</i>	<i>M. intermedia</i>
<i>Triticum repens</i>	<i>Lithospermum arvense</i>
<i>Polygonum convolvulus</i>	<i>Echium vulgare</i>
<i>P. aviculare</i>	<i>Brunella vulgaris</i>
<i>P. persicaria</i>	<i>Galeopsis ladanum</i>
<i>Melandryum album</i>	<i>G. tetrahit</i>
<i>Spergula arvensis</i>	<i>Veronica Dillenii</i>
<i>Scleranthus perennis</i>	<i>V. agrestis</i>
<i>Fumaria officinalis</i>	<i>Odontites verna</i>
<i>Teesdalea nudicaulis</i>	<i>Alectorolophus major</i>
<i>Neslea paniculata</i>	<i>Plantago lanceolata</i>
<i>Stenophragma Thalianum</i>	<i>Knautia arvensis</i>
<i>Arabis arenosa</i>	<i>Filago arvensis</i>
<i>Potentilla norvegica</i>	<i>F. minima</i>
<i>Trifolium strepens</i>	<i>Achillea millefolium</i>
<i>T. arvense</i>	<i>Centaurea cyanus</i>
<i>Astragalus arenarius</i>	<i>Leontodon autumnalis</i>
<i>Vicia angustifolia</i>	<i>Sonchus asper</i>
<i>V. hirsuta</i>	<i>S. arvensis</i>
<i>Euphorbia helioscopia</i>	

Auf feuchtem Sande treten hinzu:

<i>Panicum crus galli</i>	<i>Herniaria glabra</i> var. <i>puberula</i>
<i>Alopecurus geniculatus</i>	<i>Scleranthus annuus</i>
<i>Juncus bufonius</i>	<i>Radiola linoides</i>
<i>J. capitatus</i>	<i>Hypericum humifusum</i>
<i>Polygonum tomentosum</i>	<i>Galeopsis speciosa</i>
<i>P. nodosum</i>	<i>Mentha arvensis</i>
<i>P. minus</i>	<i>Gnaphalium uliginosum</i>
<i>Spergularia rubra</i>	

Solch ein Roggenfeld macht allerdings keinen wirtschaftlich sehr erfreulichen Eindruck.

Auf einigen mit *Linum usitatissimum* angebauten Aeckern, deren Aussaat nachweislich aus dem von den Einheimischen hier schon vor dem Kriege gebauten Lein stammte, war unter den Unkräutern auch *Lolium remotum* zu bemerken.

Beachtenswert ist das völlige Zurücktreten der in Deutschland auf den Feldern so häufigen Ackermohn-Arten. Im ganzen Gebiete wurde nur *Papaver argemone* ein- oder zweimal in wenigen Exemplaren gefunden. Hilbert erwähnt noch *Phacelia tanacetifolia* und *Silene dichotoma* als Ackerunkräuter.

22. Ruderalflora.

Die in der Kampfzone liegenden Dörfer haben unter der Kriegsfurie schwer gelitten. Da wirkt das Bestreben der Pflanzenwelt, über Schutt und Trümmer eine bergende Decke zu breiten, wahrhaft tröstlich. Aus den Gärten und den Gräben, von Anger und Wegrand, von Wiese und Feld stellen sich die Arten ein und überwuchern mit wunderbarer Schnelligkeit das Neuland.

Charakteristische Schuttpflanzen sind *Urtica dioica* und mehr noch *U. urens*, *Atriplex patulum*, *Chenopodium bonus Henricus*, *C. hybridum*, *C. rubrum*, *C. urbicum*, *C. album*, *Chelidonium majus*, *Melilotus officinalis*, *M. albus*, *Malva neglecta*, *Anthriscus silvestris*, *Solanum nigrum*, *Artemisia vulgaris*, *Arctium minus*, *A. lappa*, *A. tomentosum*, *Cirsium lanceolatum*, *C. arvense*, *Lampsana communis*, *Sonchus oleraceus*, *S. asper*. Ferner die giftigen *Conium maculatum*, *Hyoscyamus niger*, *Datura stramonium*. Sehr auffällig ist die in Massen erscheinende *Elsholzia Patrinii* in Gemeinschaft weiterer Labiaten, wie *Nepeta cataria*, *Leonurus cardiaca* (meist in der östlichen Form *villosus*), *L. marrubiastrum*, *Ballota nigra*. Dazu tritt oft *Verbena officinalis*. Ueber die Mauerreste legt sich *Humulus lupulus*. Im Schutte eines dem Walde benachbarten Gehöftes in Menge *Epilobium angustifolium*; hier auch die sonst im Gebiete nicht beobachtete *Carex contigua* (in der f. *remota* F. Schultz).

In den verwahrlosten Gärten drängen sich die Unkräuter vor: *Panicum crus galli*, *Poa annua*, *Amarantus blitum*, *A. retroflexus*, *Stellaria media*, *Thlaspi arvense*, *Sinapis arvensis*, *Raphanus raphanistrum*, *Capsella bursa pastoris*, *Erysimum cheiranthoides*, *Geranium pusillum*, *Erodium cicutarium*, *Anthriscus cerefolium*, *Aethusa cynapium*, *Anagallis arvensis*, *Cynoglossum officinale*, *Lamium purpureum*, *Veronica opaca*, *Galinsoga parviflora*, *Chrysanthemum segetum*, *Senecio vulgaris* und viele andere mehr. Aus früherer Kultur stammen: *Papaver somniferum*, *Lepidium sativum*, *Brassica rapa*, *B. napus*, *Linum usitatissimum*,

Coriandrum sativum, *Anethum graveolens*, *Daucus carota*, *Phacelia tanacetifolia*. Weiter sind verwildert: *Amarantus paniculatus*, *Hesperis matronalis*, *Malva mauritiana*, *Phlox paniculata*, *Melittis melissophyllum*, *Stachys germanica* (nach Dr. Carnap), *Nicandra physaloides*, *Nicotiana rustica*, *Calendula officinalis*. Als verwildert ist wohl auch *Campanula rapunculus* anzusehen. Häufig trifft man auf *Matricaria chamomilla* und *Chrysanthemum parthenium*, sehr häufig auf *Artemisia absinthium*. Gelegentlich überzieht *Vinca minor* größere Flecken. In einem Dorfe hatte sich die stattliche *Malva crispa* so vermehrt, daß es geradezu als „Malvendorf“ bekannt war.

Für die Dorfanger, für wüste Plätze, Straßenränder und ähnliche trockene Stellen der Ortschaften sind bezeichnend: Die Kreuzblütler *Sisymbrium sophia*, *S. officinale*, *Sinapis arvensis* (wenig), *Capsella bursa pastoris* (nicht häufig), *Arabis arenosa*, *Erysimum cheiranthoides*, *Berteroa incana*, die Leguminosen *Medicago lupulina*, *Trifolium procumbens*, *T. strepens*, *T. repens*, einmal auch das offenbar neuerdings eingeschleppte *T. ochroleucum*, die Kompositen *Xanthium strumarium*, *Anthemis tinctoria*, *A. arvensis*, *A. cotula*, *Matricaria inodora*, *M. discoidea* (herdenweise), *Chrysanthemum vulgare*, *Artemisia absinthium*, *Carduus crispus*, *Centaurea jacea*, *C. cyanus*, *Taraxacum officinale* (nicht häufig), *Crepis biennis*, *C. tectorum*. Von Labiaten finden sich die oben als Schuttpflanzen genannten auch hier häufig ein, dazu tritt gelegentlich in Menge die schöne *Nepeta grandiflora* als Gartenflüchtling. Von Gräsern sind *Setaria glauca*, *Poa compressa*, *Bromus hordeaceus*, *Lolium perenne*, *Triticum repens* (auch in var. *caesium*) zu nennen; mit ihnen *Carex hirta*. Ueberall häufig sind *Rumex acetosella*, *Polygonum aviculare*, *Atriplex patulum*, *Chenopodium album*, stellenweise auch *Polygonum persicaria* und *Chenopodium bonus Henricus*. Im übrigen verdienen noch *Dianthus deltoides*, *Potentilla argentea*, *P. anserina*, *Geranium pusillum* und *molle* (erstes häufig, zweites zerstreut), *Malva alcea* (in großen Büschen), *M. neglecta*, gelegentlich auch *M. rotundifolia*, *Torilis anthriscus* (zerstreut), *Verbena officinalis*, *Linaria vulgaris*, *Plantago major*, *P. lanceolata* und *Galium aparine* Erwähnung. Besonders auf sandigen Stellen *Agrimonia odorata*¹, *Verbascum thapsus* (wenig), *V. thapsiforme* (ganz vereinzelt), *V. phlomoides* (viel), *V. nigrum*, *Campanula bononiensis*, *Centaurea jacea* var. *tomentosa*.

Feuchte Gräben in und bei den Ortschaften und längs der Hauptverkehrswege bieten manches Beachtenswerte: *Rumex obtusifolius*, *Chenopodium glaucum*, *Potentilla norvegica*, *Geum strictum*, *Geranium pratense*, *G. palustre*,

¹ Hilbert gibt von gleichen Standorten *A. pilosa* an; *A. odorata* ist bei Lehmann überhaupt nicht genannt, kommt aber in Süd-Rußland vor.

Hypericum quadrangulum, *Epilobium roseum*, *Heracleum sibiricum* (in f. angustifolium), *Scrophularia nodosa*, *Veronica anagallis*, *V. beccabunga*, *Senecio barbaraeifolius* (einmal gefunden), *Lampsana communis*. Von Gräsern seien *Poa serotina* und *P. trivialis* hervorgehoben. *Polygonum Hydropiper* bildet dichte Bestände; *P. tomentosum* und *Rumex crispus* sind mehr zerstreut. Im übrigen beobachtet man noch: *Scirpus palustris*, *Juncus bufonius*, *Ranunculus sceleratus*, *R. acer*, *Nasturtium palustre*, *Anthriscus silvestris*, *Mentha arvensis*, *Gnaphalium uliginosum*, *Sonchus arvensis* und viele andere mehr. Gelegentlich trifft man auf Rasen auch *Bellis perennis* an.

In den Dörfern ist der Bestand an Bäumen, auch an Obstbäumen, verhältnismäßig gering. Um die Kirche und auf dem Friedhofe stehen einige *Picea excelsa* und *Pinus silvestris*, wenig *Quercus robur* und *Acer platanoides*, häufiger *Betula verrucosa* und *Tilia cordata*. An Teichen einige Weiden — auf *Salix alba* nicht selten reichlich *Viscum album* —, gelegentlich *Betula pubescens*, wohl auch einmal *Fraxinus excelsior* und häufiger *Populus tremula*. Die Dorfstraße beschattet meist *Tilia cordata* (auch hier öfter *Viscum album*), weniger *Ulmus levis*. Auch *Pirus aucuparia* ist nicht selten. Die Obstbäume werden in den Gärten und auf den Feldern durch minderwertige, halbwilde Sorten von *Pirus communis* und *P. malus* vertreten. Von Sträuchern trifft man in den Gärten hier und da *Syringa vulgaris*, auch *Evonymus europaea* und *Viburnum opulus*. *Sambucus nigra* sah ich sehr selten. Bei Rittergütern gelegentlich kleinere Parks, in einem Falle ein größerer mit ausländischen Gehölzen und besseren Obstsorten.

Sukzessionen.

Auf die Frage der genetischen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Pflanzenvereinen einzugehen, ist in dem vorliegenden Falle bei der kurzen Beobachtungszeit ein gewagtes Unternehmen. Doch dürften einige weitere Andeutungen über das bei den einzelnen Schilderungen darüber Gesagte hinaus immerhin am Platze sein.

Daß die „Echte Heide“ dazu neigt, in „Kiefernheide“ überzugehen, ist schon oben erwähnt worden. Auch daß die Tätigkeit des Menschen aus Heideflächen Sandfelder schafft, die sich selbst überlassen bald wieder verheiden.

Der „Kiefernwald“ ist durch Uebergänge mit dem „Kiefern-mischwalde“ verbunden. Man kann wohl sagen, daß auf Böden mit mittlerem Grundwasserstande, wie er für beide Typen Voraussetzung ist, der erstgenannte

mehr eine Uebergangs-, der letztgenannte mehr eine Dauer-Coenose darstellt. Im natürlichen Verlauf der Dinge dürfte ja überhaupt immer eher ein Mischwald als ein einartiger Baumbestand das Ziel der Entwicklung sein. Doch wirken mehrere Faktoren zugunsten der Kiefer ein. So schreibt Rubner (1918, p. 283) vom Bialowieser Walde: „Es ist kein Zweifel, daß ein Teil der Kiefernwaldungen früher Mischwald war, an dessen Zusammensetzung Fichte, Eiche, Birke wesentlichen Anteil hatten. Nonnenfraß und Waldbrände haben diese 3 Holzarten zurückgedrängt, wogegen die gegen beide Gefahren widerstandsfähigere Kiefer siegreich geblieben ist“. Aber eine solche gewaltsam regressive Entwicklung wird bald wieder in eine progressive übergehen. Gewiß greift auch der Mensch im behandelten Gebiete gelegentlich in den Entwicklungsprozeß in einem für die Kiefer günstigen Sinne ein. Die Verwandtschaft von Kiefernwald und Kiefern-mischwald tritt besonders deutlich in der Ähnlichkeit der bei beiden innerhalb der Bodenvegetation geschiedenen Assoziationen zutage. Innerhalb jeder der beiden Biocoenosen scheint zwischen den drei Assoziationstypen, die in der Besprechung oben angenommen sind, ein gewisser Wechsel stattzuhaben.

Rodung und Beweidung führen auf dem Terrain des Kiefernwaldes und des Kiefern-mischwaldes wohl meist zur „Buschtrift“.

Der „Fichtenmischwald“ ist zwar ebenfalls mit dem „Kiefern-mischwald“ durch Zwischenglieder verbunden. Doch hat man es hier wohl zum geringeren Teile mit einer Sukzession zu tun und mehr mit topographischen Uebergängen. Im Terrain des Fichtenmischwaldes entsteht durch Rodung und Beweidung die „Wacholdertrift“, die bisweilen auch in „Wiese“ übergeführt wird.

In beiden Mischwäldern finden sich kleinere und größere Moorflächen eingesprengt. Sie stehen teils in dem Stadium des Flachmoores, teils in dem des Uebergangsmoores von teilweise schon dem Hochmoore sehr nahe kommenden Charakter. Es sind wohl vielfach extralakustre Moorbildungen. Die tiefer gelegenen Partien des Waldbodens, Mulden und Einsenkungen, neigen bei dem hohen, vielfach sehr hohen, Grundwasserstande leicht zur Versumpfung. Der Gang der Entwicklung scheint nicht überall der gleiche gewesen zu sein. Es wird zwar in der Regel zunächst eine Flachmoorbildung einsetzen; doch dürfte diese Stufe oft schnell überschritten werden, oft aber auch ganz ausfallen, so daß der versumpfte Waldboden gleich ein Moor von Uebergangscharakter gebiert, wie das H. G r o ß (1912, p. 192) auch aus Ostpreußen angibt. Lakustre Bildungen leiten sich von ehemaligen kleineren

Waldseen und Tümpeln her. Es ist für den Ablauf des Moorentwicklungsprozesses von Bedeutung, in welchem Maße und wie oft Ueberflutungen des Moorgeländes aus dem umgebenden, höher liegenden Walde erfolgen. Finden solche Ueberschwemmungen alljährlich einmal oder gar mehrere Male statt, so bleibt es infolge der zugeführten Nährstoffmenge beim Flachmoorstadium. Finden sie nur selten statt, so werden sie die Entwicklung zu den höheren Stadien nicht mehr aufhalten, wohl aber wirken sie hemmend. Und da wohl die meisten kleineren Waldmoore bei der Schneeschmelze mindestens alle paar Jahre einmal auch von außen her überflutet werden, so ist es verständlich, daß unter ihnen keines typischen Hochmoorcharakter angenommen hat. Daß aber auch größere Komplexe nicht wenigstens im zentralen Teile zu wirklichen Hochmooren geworden sind, liegt wohl an dem kontinentalen Klima. Immerhin handelt es sich bei einer ganzen Reihe der Wald-Uebergangsmoore um ein dem Hochmoor recht verwandtes Gebilde, und man kommt vielleicht mit der von Potonié (1919, p. 328) vorgeschlagenen Bezeichnung „Landklima-Hochmoor“ dem Wesen der Sache am nächsten. Was Potonié unter dieser Bezeichnung versteht, zählt Wangerin (1915, p. 196), meines Erachtens ganz richtig, noch zu den „Uebergangsmooren“.

Der „Ufersumpf“ der kleineren Abflüsse wandelt sich leicht in das „Erlenfließ“ um und kann sich nur dort erhalten, wo stärkere Wasserbewegungen und Eiswirkung baumfeindlich auftreten, im Gebiete also nur an der Schtschara, der Myschanka und der Lipnitsa, hat aber hier wieder einen scharfen Konkurrenten im „Wiesenmoor“, das vielfach seine Nachfolge antritt. Aus dem „Erlenfließ“ kann durch Entwässerung eine „Erlen-Wacholder-Trift“ werden.


Ganz besonders interessante Sukzessionsfragen bietet der Gebietsteil dar, der dem Poljesje angehört (siehe Kartenskizze 2).

Gewaltige Zeiträume müssen vergangen sein, bis auf dem Sandboden dieses riesigen Beckens eine viele Meter hohe Schicht von Faulschlamm und Torf sich angehört hatte, so daß an Stelle des offenen Wassers erst Sumpf- und dann Moorbildungen traten. In dem untersuchten Randstück werden die Dinge besonders durch die Schtschara kompliziert, die durch ihren kurzen Besuch die hydrographischen Verhältnisse und damit das Vegetationsbild erheblich beeinflußt. Ein Blick auf die Skizze zeigt, wie sie durch ihre Tätigkeit ein breites Wiesenmoor-Band geschaffen hat. In der Krümmung liegt der große Bruchwald. Südlich des Flusses die weite Stagnationszone. Daß der Bruchwald dauernd existieren kann, verdankt er den großen Ueberschwemmungen, die ihn periodisch überfluten, mineralische Nährstoffe zuführen und den Boden mit sauerstoffreichem Wasser durchtränken und so der

Erle die zum Leben notwendigen Bedingungen schaffen. Auch das Weiden-Strauchmoor steht unter den Einwirkungen der Flußüberschwemmungen. Darauf weist besonders das recht häufige Vorkommen von Erlensträuchern hin. Der Strauchcharakter dieses Streifens und das Vordrängen der Weiden findet wohl in der an der Umbiegung besonders starken mechanischen Wirkung von Hochwassern und Eisgang seine Deutung. Auch der Birkenmoorwald, soweit er Flachmoorcharakter hat, verdankt seine Wesensart den Ueberschwemmungen. Doch spielen diese hier am Außenbogen lange nicht mehr die Rolle wie im Innenbogen, so daß die Erle durch die anspruchslosere Moorbirke vertreten wird. Wo die Vegetationsförderung durch das periodische Oberwasser weiter nachläßt — und das wird im Laufe der Zeit infolge des Anhöhens des Torfbodens immer näher nach dem Flusse hin der Fall sein — weicht der Birken-Flachmoorwald dem Birken-Uebergangsmoorwald, und dieser klingt schließlich in das Birken-Strauchmoor mit typischer Uebergangsmoor-Vegetation aus. Man kann im Hinblick auf die Entwicklungstendenzen wohl sagen, daß sich zurzeit Bruchwald und Weidenstrauchmoor in einem Dauerzustande befinden; während der Birkenmoorwald teilweise im Zurückweichen, das Birkenstrauchmoor im Vordringen begriffen ist.

Eingeschlossen in einen Moorkranz von teils Flach-, teils Uebergangsmoorcharakter liegt das Chamaedaphne-Hochmoor da, mit seinen Nachbarn, über die es sich im Laufe langer Zeiten erhoben hat, durch überleitende Zwischenzonen verbunden. Geht man bei der Definition dieses Gebildes von der Beschaffenheit des Geländes aus, so zwingt die uhrglasförmige Gestalt und der Sphagnum-Eriophorum vaginatum-Torf zu der Bezeichnung „Hochmoor“. Betrachtet man aber die Vegetation als ausschlaggebend, so kann man bei dem Reichtum an Kleinsträuchern und besonders bei der guten Entwicklung der Kiefern — man sollte doch auf einem solch oligotrophen Substrat höchstens Krüppelformen erwarten — nur von einem „Uebergangsmoore“ sprechen. Es kommt hinzu, daß nach Webers Untersuchungen (siehe oben p. 53) die Ericaceen erst in später Zeit eingewandert sein können. Seit der Epoche, da sich der untersuchte Torf gebildet hat, müssen ganz erhebliche Aenderungen in den Vegetationsbedingungen eingetreten sein. Solche Aenderungen dürfte der Bau des Oginski-Kanales herbeigeführt haben. Es ist klar, daß seine Anlage — er wurde 1804 dem Verkehr übergeben — mitten durch das Sphagnetum hindurch den Wasserhaushalt des Geländes beträchtlich gestört hat. Das Wachstum der Torfmoore konnte nicht mehr mit der früheren Schnelligkeit erfolgen, und so wurde das Erstarken der Kiefern und die Ansiedelung der Kleinsträucher begünstigt. Man hat somit ein Regressionsstadium vor sich, das aber alles in allem gesehen noch zur Hochmoorklasse gehört.


1. Weidenstrauchmoor.
2. Bruchwald.
3. Niesern = Erlen Band.



Vierte II.

Maßstab: 1:200000

Das folgende Schema mag eine ungefähre Darstellung der Sukzessionen des Poljesje-Teiles geben:



Vergleiche mit anderen Gebieten.

1. Bialowies.

Etwa 125 km westlich des untersuchten Gebietes liegt der berühmte „Urwald“ von Bialowies, der während des Krieges durch die deutsche Militärforstverwaltung gründlich erforscht wurde. Der Name „Urwald“ hat, wie Rubner (1918) nachweist, nur eingeschränkte Gültigkeit, doch besitzt kein Waldgebiet von solcher Ausdehnung in Mitteleuropa, ja kaum in ganz Europa, ein gleich hohes Maß von Ursprünglichkeit. Das Waldgebiet an der Schtschara ist von weit kleinerer Flächenausdehnung und steht daher in stärkerer Berührung mit den Siedelungen, kommt aber in seinen inneren Partien und besonders in den Bruchwald- und Moorwaldteilen an Unberührtheit dem Bialowieser Forste wohl gleich.

Die forstliche Zusammensetzung der beiden Waldgebiete weist beträchtliche Unterschiede auf, die in der Hauptsache auf die großen topographischen Verschiedenheiten zurückzuführen sind. Zunächst scheidet bei einem Vergleiche der auf Poljesje-Boden stockende Teil des Schtschara-Waldes aus, da ihm Bialowies kaum Gleichwertiges an die Seite zu setzen vermag. Wohl hat dieses auch weite Moorgebiete, aber der ganz eigentümliche Charakter jener Bruch- und Moorwälder, wie er durch die Zugehörigkeit zu dem gewaltigen

Verlandungsbecken des Poljesje bedingt ist, konnte nicht zur Entfaltung gelangen. Aber auch die auf dem Diluvium und seiner Randzone erstandenen Wälder ähneln den Waldungen von Bialowies nur zum Teile. Einen beträchtlichen Prozentsatz des Bialowieser Forstes nimmt ein reiner Laubwald ein, der die besseren Böden besetzt. Er hat in den trockenen Partien neben der den Grundstock bildenden *Carpinus* zahlreiche *Quercus robur*, *Fraxinus*, *Ulmus scabra* und *campestris*, *Tilia cordata*, *Acer platanoides*, *Betula verrucosa*, *Populus tremula* aufzuweisen. Dem würden an der Schtschara nur die laubholzreicheren Teile des Kiefernmischwaldes einigermaßen entsprechen. Ein gewichtiger Grund für das Zurücktreten eines solchen Waldbildes ist wohl der, daß man es hier mit einem Restwald zu tun hat, der seine gutgründigen Teile im Laufe der Zeit der vordringenden Besiedelung mehr und mehr hat abtreten müssen. In den feuchteren Partien von Bialowies weicht die Hainbuche der Erle; Linden, Ahorn, Ulmen und zum Teil auch Eichen verschwinden; dagegen macht sich die Fichte mehr bemerkbar. Damit sind wohl die laubholzreicheren Teile des Fichtenmischwaldes an der Schtschara in Parallele zu stellen. Reiner Kiefernwald ist dort wie hier vertreten; reiner Fichtenwald, dort etwa 7 Proz. ausmachend, fehlt hier fast ganz. „Mischbestände aus Laub- und Nadelholz“ nehmen dort etwa 13 Proz. ein, stocken hauptsächlich auf anmoorigen, nassen Böden und stellen eine Mischung aus Kiefern, Eichen, Birken, Espen oder Kiefern, Fichten, Eschen usw. dar. Sie entsprechen wohl am meisten gewissen Teilen unseres Fichtenmischwaldes, doch bleibt hier unter den Laubhölzern immer, oder doch fast immer, die Hainbuche im Vordergrund. In bezug auf den Gesamtbaumbestand (von Moor- und Bruchwald abgesehen) kann man wohl sagen, daß in Bialowies die Kiefer eine größere Rolle spielt, während an der Schtschara Fichte und Hainbuche prozentual stärker hervortreten. Linden fehlen dem Schtschara-Walde und Ulmen sind sehr selten; doch finden sich beide in Mischwaldbeständen auf den diluvialen Inseln des Poljesje wieder.

Unterholz ist dort wie hier in den meisten Waldpartien nicht viel vorhanden und die Artenzahl der Sträucher eine auffällig geringe. Bialowies hat *Prunus padus* und *Cornus sanguinea* voraus. Die Tendenz der Fichte sich vorzudrängen ist auch im Walde von Bialowies sehr merkbar.

Das Zurücktreten des Unterholzes, auch des Jungholzes außer bei *Picea*, wird in Bialowies (siehe Lautenschlager, 1917, p. 65) auf den übermäßig großen Wildbestand zurückgeführt. Da jedoch an der Schtschara dieser Grund sicherlich nicht ausschlaggebend ist, müssen andere Ursachen mitspielen. Hauptsächlich wohl Lichtmangel in den Mischwäldern mit ihrem infolge der Mischung meist recht dichten Kronenschluß und außerdem die scharfe Wurzelkonkurrenz.

Leider steht eine Florenliste von Bialowies aus neuerer Zeit noch aus, ebenso eine eingehendere formationsbiologische Schilderung, von der Graebners Aufsatz (1918) in den Veröffentlichungen der deutschen Militärforstverwaltung nur ein Vorläufer ist. Eine genaue formationsstatistische Vergleichung ist daher noch nicht möglich. Bemerkenswert ist, daß unserem Gebiete von dort häufigen Pflanzen des Laub- oder Mischwaldes *Poa nemoralis*, *Hordeum silvaticum*, *Carex pilosa*, *Epipactis latifolia*, *Isopyrum thalictroides*, *Ranunculus cassubicus*, *Mercurialis perennis*, *Chaerophyllum aromaticum* u. a. m. fehlen, die auch von Reinhard (1891), dessen Gebiet zwischen den beiden zum Vergleich stehenden liegt, nicht angegeben werden und zumeist auch in den Mischwäldern der Poljesje-Inseln nicht vorkommen oder doch sehr zurücktreten. Andere in Bialowies häufige Arten sind an der Schtschara sehr zerstreut. Der Grund für diese Artenminderung ist wohl hauptsächlich in der größeren Bodenkälte und anderen mit der Lage am Rande der großen Sumpfniederung zusammenhängenden Faktoren zu suchen.

Aus dem trockenen Walde fehlen an der Schtschara: *Gymnadenia conopsea*, *Epipactis rubiginosa*, *Gypsophila fastigiata*, *Cytisus ratisbonensis*, *Dracocephalum Ruyschiana*, die auch Reinhard sämtlich nicht nennt, die aber außer *Epipactis* für manche Kiefernwälder auf trockenem Boden der Poljesje-Sandschollen charakteristisch sind. Andererseits, doch scheint das in geringerem Grade der Fall zu sein, ist auch manche Waldpflanze in unserem Gebiete häufiger als im Bialowieser Walde, z. B. *Equisetum pratense*; *Linnaea borealis* fehlt anscheinend dort.

Von interessanteren Typen sind beiden Gebieten gemeinsam aus dem Mischwalde: *Hierochloa australis*, *Calamagrostis arundinacea*, *Poa remota*, *Gymnadenia cucullata*, *Stellaria Friesiana*, *Dentaria bulbifera*, *Geum strictum*, *Epilobium Graebneri* (siehe unten p. 77), *Circaea alpina*, *Galium Schultesii*, *Campanula cervicaria*, *Centaurea phrygia* usw., aus dem Kiefernwald: *Pulsatilla patens*, *Trifolium lupinaster*, *Astragalus arenarius*, *Hypochoeris maculata*, *Scorzonera humilis* usw.

Wie in den Waldungen an der Schtschara finden sich auch in denen von Bialowies größere und kleinere Moore von teils Flachmoor-, teils Uebergangsmoor-Charakter. Doch ist eine so starke Annäherung an den Hochmoortypus, wie sie uns bei den „Landklima-Hochmooren“ (siehe oben p. 64) entgegentritt, in Bialowies nur selten zu beobachten. Den Waldmooren beider Gebiete sind als bezeichnende Arten gemeinsam: *Eriophorum gracile*, *Carex lasiocarpa*, *Malaxis paludosa*, *Salix myrtilloides*, *Ledum*, *Andromeda polifolia*, *Vaccinium oxycoccus* und *uliginosum*, nach mündlicher Mitteilung von Graebner auch *Carex loliacea*, *C. tenella*, *Salix livida*, *S. lapponum* u. a. m. *Carex sparsiflora* var. *Gruetteri* fehlt anscheinend in Bialowies. In unserem Ge-

biote vermißt man die dort häufigen *Saxifraga hirculus* und *Pedicularis sceptrum Carolinum*, von denen die letzte dem Poljesje wohl überhaupt abgeht.

Die Wiesenmoore beider Gebiete sind sich in ihrem Schmucke von *Gladiolus imbricatus*, *Thalictrum flavum*, *Lathyrus paluster*, *Gentiana pneumonanthe*, *Veronica longifolia* usw. recht ähnlich. An der Schtschara sind *Tofieldia calyculata*, *Iris sibirica*, *Trollius europaeus* und *Cirsium rivulare* nicht beobachtet, kommen aber außer *Trollius* wieder in dem Poljesje vor.

Die von Graebner (1918, p. 237—328) geschilderten großen Flächen eines nassen, monotonen Seggenmoor-Typus fehlen dem Schtschara-Gebiete. Dafür hat dieses die weiten Birkenstrauchmoore und das *Chamaedaphne*-Hochmoor voraus. *Chamaedaphne calyculata* fehlt in Bialowies gänzlich.

2. Kongreß-Polen.

Zieht man die Misch-Wälder Kongreß-Polens, wie sie Pax (1918) skizziert, mit zum Vergleiche heran, so treten die Unterschiede, die gegenüber dem Bialowieser Walde festgestellt wurden, noch stärker hervor, ohne jedoch die Verwandtschaft des Grundcharakters verwischen zu können. Am meisten berühren sich die Kiefern-mischwälder. Im allgemeinen läßt sich erkennen, daß nach Westen hin die Kiefer immer stärker in den Vordergrund, die Fichte immer mehr zurück (fehlt in Mittelpolen) tritt, daß die Hainbuche ihre Rolle als Leitpflanze der Laubhölzer beibehält, bis sie diese weit im Westen an *Fagus silvatica* abtreten muß. Bemerkenswert ist, daß zahlreiche Charakterpflanzen der polnischen Rotbuchenwälder sich noch im Schtschara-Walde, weit von der Ostgrenze der Rotbuche entfernt, als häufige Mischwaldpflanzen wiederfinden, so *Melica nutans*, *Poa remota*, *Carex digitata*, *Neottia nidus avis*, *Asarum europaeum*, *Stellaria holostea*, *Ranunculus lanuginosus*, *Vicia silvatica*, *Lamium galeobdolon*, *Asperula odorata* usw. Am nächsten stehen den von uns geschilderten Waldtypen die Wälder des nordöstlichen Polens, besonders wohl die des Gouvernements Suwalki. In bezug auf die Moor- und Sumpfvvegetation besteht dagegen die größte Annäherung an das „Ostpolnische Sumpfgebiet“ von Pax (am unteren Wieprz), das stark von dem Poljesje beeinflusst wird. Erwähnt sei noch, daß die „Wacholderheide“ und „Buschheide“ bei Pax als naturwüchsige Biocoenosen etwas ganz anderes als die sekundären: „Wacholdertrift“ und „Buschtrift“ an der Schtschara sind. Die „Sandheide“ hat zwar in ihrer Artenliste viel Ähnlichkeit mit unseren „Sandfeldern“, ist aber ebenfalls genetisch davon geschieden, während die „Kiefernheiden“ und mehr noch die „Calluna-Heiden“ dort und hier übereinstimmen.

3. Polnisch-Livland.

Die Vegetationsschilderung, die Lehmann in dem seiner „Flora von Polnisch-Livland“ vorausgeschickten allgemeinen Teile gibt, läßt trotz der

knappen Gliederung eine Parallelisierung seines etwa 400 km nördlich gelegenen Gebietes mit dem unsrigen zu.

Bemerkenswert ist die trotz der erheblichen Entfernung fast gleiche Zusammensetzung der Vegetation der trockenen Wälder und Heiden. Die etwa 70 Arten, die Lehmann als für seine „Trockenen Kiefernwälder“ charakteristisch angibt, sind unserem „Kiefernwald“ und den trockenen Teilen des „Kiefernmischwaldes“ fast restlos — es fehlen nur etwa *Gypsophila fastigiata* und *Sempervivum soboliferum* — eigen. Das Schtschara-Gebiet hat jedoch *Anthericum ramosum*, *Trifolium lupinaster*, *T. alpestre*, *Astragalus danicus*, *Coronilla varia*, *Lathyrus montanus*, *Arnica montana* voraus. Was Lehmann als bezeichnend für „Heiden, sandige, lichte Kiefernwaldblößen und deren Randzonen sowie Sandfelder“ nennt, kehrt ebenfalls in den entsprechenden Teilen unseres Gebietes wieder, wobei Erwähnung verdient, daß die hier so häufigen *Corynephorus canescens* und *Teesdalea nudicaulis* dort fehlen.

Weit weniger stark ist die Uebereinstimmung zwischen den Mischwäldern.

Die „Gemischten Fichtenwälder des Niederungsgebietes“ mit vorherrschender *Picea excelsa*, daneben *Betula pubescens*, *Quercus robur*, *Acer platanoides*, *Fraxinus excelsior* usw. entsprechen zwar in vielem unseren „Fichtenmischwäldern“. Aber es sind doch erhebliche Abweichungen vorhanden. Die forstlich bedeutsamen Unterschiede gegenüber dem Schtscharawalde sind in erster Linie das völlige Fehlen von *Carpinus betulus*, deren Nordgrenze weiter südlich liegt, in zweiter Linie das Auftreten von Linden und Ulmen, das dichte Unterholz (mit *Prunus padus*) — auch hier *Picea* sehr eroberungssüchtig —, in der Bodenflora das Fehlen von *Gymnadenia cucullata*, *Ranunculus lanuginosus*, *Cardamine flexuosa* With., *Dentaria bulbifera*, *Cnidium venosum*, *Galium Schultesii*, *Serratula tinctoria* usw., das Hinzutreten von *Onoclea struthiopteris*, *Actaea spicata*, *Ranunculus cassubicus*, *Mercurialis perennis*, *Viola mirabilis*, *Chaerophyllum aromaticum*, *Stachys silvatica* u. a. m.

Die „Gemischten Wälder in der Hügellandschaft und Waldschluchten“, in denen die Kiefer hervortritt und unter den Laubbäumen *Tilia cordata*, lassen sich mit unseren „Kiefernmischwäldern“ nur sehr bedingt in Parallele setzen. Immerhin finden sich in unserer Biocoenose 27 Arten von den 42, die Lehmann als charakteristisch für seine Hügel- und Schluchtwälder angibt.

Einer Vergleichung der Moorflora beider Gebiete setzt die geringe Gliederung der Moore bei Lehmann Schwierigkeiten entgegen. Doch ergibt sich für Wiesenmoore, Waldflachmoore und Waldübergangsmoore viel Uebereinstimmung. Polnisch-Livland hat u. a. voraus in Flachmooren *Carex caespitosa* und *Eriophorum latifolium*, in „Torfmooren“, das sind wohl

in der Hauptsache Uebergangsmoore: *Empetrum nigrum* und (die minder häufigen) *Saxifraga hirculus* und *Pedicularis sceptrum Carolinum*. Stärker als an der Schtschara treten *Betula humilis* und *Chamaedaphne calyculata* hervor. Dagegen finden sich die für die Waldmoore unseres Gebietes so charakteristischen — allerdings besonders in der Randzone vorkommenden — *Carex loliacea*, *C. tenella*, *C. sparsiflora* var. *Gruetteri* in Polnisch-Livland nur an feuchten Waldstellen.

Wasser- und Uferflora stimmen weitgehend überein. Bemerkenswert erscheint noch, daß von den Arten, die am Poljesje-Rande als Charakterpflanzen feuchter sandiger und lehmiger Gräben erscheinen, in dem zum Vergleich stehenden nördlichen Gebiete *Juncus capitatus*, *Radiola linoides*, *Hypericum humifusum*, *Centunculus minimus*, *Gnaphalium luteo-album* und *Scirpus ovatus* völlig fehlen.

In bezug auf die Flora der Brachen, auf die Unkraut- und Ruderalflora herrscht infolge ähnlicher kultureller Verhältnisse weitgehende Uebereinstimmung. Von Gegensätzen mögen folgende hervorgehoben werden: *Matricaria chamomilla*, im Gebiete der Schtschara in und bei allen Dörfern häufig, wächst in Polnisch-Livland nur sehr zerstreut, und der dort für Ruderalplätze recht charakteristische *Leonurus marrubiastrum* fehlt hier ganz. Dagegen vermißt man an der Schtschara: *Lepidium ruderales*, *Barbarea vulgaris*, *Camelina microcarpa*, *Bunias orientalis*, und merkwürdig wenig sieht man *Sinapis arvensis*, *Raphanus raphanistrum*, *Capsella bursa pastoris*. Für beide Gebiete ist das Fehlen von *Myosotis hispida* und das völlige Zurücktreten der Ackermohnarten bemerkenswert. Graebner (1918) erwähnt auch für das Bialowieser Gebiet den auffälligen Mangel an vielen „Allerweltsunkräutern“ und führt ihn darauf zurück, daß die Bauern stets nur selbstgeerntete Saat aussäen. Von Ausländern sind an der Schtschara wie in Polnisch-Livland *Matricaria discoidea* und mehr noch *Erigeron canadensis* völlig eingebürgert und treten in Massen auf, zurückhaltender ist *Galinsoga parviflora*. Offenbar erst in neuester Zeit durch den Bau der Front-Kleinbahnen wurde die bei Lehmann häufige *Oenothera biennis* in unser Gebiet eingeschleppt.

4. Ostpreußen.

Daß unter den Wäldern der norddeutschen Tiefebene die ostpreußischen mit den an der Schtschara vertretenen Typen die meiste Verwandtschaft zeigen, ist aus den geographischen Beziehungen leicht verständlich. Besonders gilt das für die Mischwälder des östlichen Ostpreußens. Das Fehlen von *Fagus*, das Hervortreten von *Picea*, *Carpinus*, *Populus tremula*, von *Evonymus verrucosa*, das Vorkommen von *Hierochloa australis*, *Gymnadenia cucullata*, *Stellaria Friesiana*, *Trifolium lupinaster*, *Centaurea phrygia* usw. schaffen

einen prägnanten Gegensatz gegen den Westen. Weit schärfer noch tritt das in bezug auf gewisse Moorvereine in Erscheinung. Zum Beispiel haben die fichtenreichen Randzonen der oben beschriebenen „Wald-Uebergangsmoore“ mit den Waldmooren Ostpreußens (G r o ß, 1912), besonders den Fichten-Waldmooren, gemeinsam: *Carex loliacea*, *C. tenella*, *C. sparsiflora* var. *Gruetteri*, *Salix livida*, *S. lapponum*, *S. myrtilloides*, *Stellaria Friesiana*, alles Arten, die teils in Ostpreußen eine Westgrenze erreichen, teils nur wenig weiter nach Westen hin vordringen. In diesem Zusammenhange sei auch noch *Chamaedaphne calyculata* genannt, die in Ostpreußen für manche Uebergangsmoore typisch ist und am Oginskikanal die Regression des dortigen Hochmoores anzeigt.

Wangerin hat (1915, p. 194 ff.) eine Gliederung der Moortypen mit besonderer Bezugnahme auf Ostpreußen gegeben. Die folgende Tabelle mag dazu dienen, seine Typen mit den von uns beschriebenen in Parallele zu setzen:

I. Flachmoorwälder

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Erlensumpfmoorwald | Erlenfließ |
| 2. Erlenstandmoorwald | Bruchwald |
| | Nebentypus: Birken-Moorwald mit Flachmoorcharakter |

II. Flachmoorwiesen

- | | |
|---------------|----------------------------|
| 3. Torfwiesen | Wiesenmoor |
| | Nebentypus: Wald-Flachmoor |

III. Reiserflachmoore

Weiden-Strauchmoor

IV. Zwischenmoorwälder

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Birken-Zwischenmoorwald | Birken-Moorwald mit Uebergangsmoorcharakter |
| 3. Fichten-Zwischenmoorwald | Fichtenreiche Randzone der Wald-Uebergangsmoore |

V. Reiserzwischenmoore

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 3. Zwischenmoor-Betuleta | Birken-Strauchmoor |
| 6. „Landklima-Hochmoor“ | Wald-Uebergangsmoor |

VI. Weißmoore

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 2. Eriophoretum vaginati-Sphagnetum | Hochmoor am Oginski-Kanal vor der Regression. |
| | Nebentypus: Chamaedaphne-Hochmoor. |

5. Poljesje.

Das durch Versumpfung und Verlandung entstandene Moorland Poljesje hat, wie sich aus solcher Entwicklung verstehen läßt, seine ältesten Teile an der Peripherie.

Regel (1913) gibt an: Im Zentrum sind Rohrsümpfe und Wiesenmoore weit verbreitet. In den Randpartien findet man meist Uebergangsmoore und recht selten Hochmoore. Im nördlichen Gebiete fehlen Rohrsümpfe mit Ausnahme der nächsten Umgebung der Flüsse. Wiesenmoore ohne Moosteppich trifft man dort, wo das nahe Grundwasser und die jährlichen Ueberschwemmungen der Flüsse der Bildung eines Moosteppichs hinderlich sind. Uebergangsmoore entstehen oft aus Wiesenmooren.

Das alles findet in dem Schtschara-Poljesje seine Bestätigung, so daß der untersuchte Niederungs-Ausschnitt wohl als Illustration für die ganze nördliche Randzone dienen kann, zumal auch die floristische Zusammensetzung der von Regel beschriebenen Moore — etwa 100 km im Osten der Schtschara gelegen — der von mir festgestellten sehr gleicht. So sind mir von den etwa 50 Arten, die Regel als charakteristisch für unberührte Wiesenmoore angibt, nur 3, nämlich *Calamagrostis pseudophragmites*, *Carex limosa* und *C. elata*, und von etwa 30 Arten der Uebergangsmoore nur 2, nämlich *Eriophorum latifolium* und wieder *Carex limosa* nicht begegnet. Das einzige von Regel geschehene „Moor mit *Sphagnum*-Torf“ ist in seinem erhöhten zentralen Teile mit vereinzelt verkrüppelten *Pinus silvestris*- und *Betula pubescens*-Bäumchen besetzt und weist hier auch — die von ihm nur an dieser Stelle beobachtete — *Chamaedaphne calyculata* auf. Im ganzen verzeichnet er von diesem Gebiete 17 Arten, die alle in dem am Oginski-Kanale gelegenen *Chamaedaphnetum* vorkommen, wiederum von *Carex limosa* abgesehen. Ob diese Art wirklich im Schtschara-Gebiete fehlt, muß ich dahingestellt sein lassen, doch ist es höchst unwahrscheinlich.

In der Arbeit von Paczowski (1900) sind die charakteristischen Pflanzen der hauptsächlichsten Vegetationsglieder des Poljesje zusammengestellt. Zieht man seine Listen zum Vergleich heran, so ergibt sich, daß auf Wiesen- und Uebergangsmooren im Gesamt-Niederungsgebiete außer den im Schtschara-Abschnitte festgestellten noch folgende Arten von Bedeutung sind, von denen gewiß noch manche im untersuchten Gebiete vorkommen: *Eriophorum latifolium*, *Carex dioica*, *C. Davalliana*, *C. vulpina*, *C. paradoxa*, *C. paniculata*, *C. gracilis*, *Tofieldia calyculata*, *Veratrum album* var. *Lobelianum*, *Iris sibirica*, *Thalictrum simplex*, *T. angustifolium*, *Saxifraga hirculus*, *Sanguisorba officinalis* und die nach Süden gravitierenden: *Juncus atratus*, *Lythrum virgatum*, *Cirsium rivulare*. Was Paczowski als für *Sphagneta* charakteristisch anführt, findet sich alles außer *Drosera anglica* und wiederum

Carex limosa auch auf unserem Chamaedaphne-Hochmoor, wenn man dessen Randzone mitrechnet. Diese Sphagneta sind nicht eigentliche Hochmoore, sondern mit ihrem Reichtum an *Ledum*, *Andromeda*, *Chamaedaphne*, *Vaccinium oxycoccus* und auch *Betula humilis* mehr etwa „Landklima-Hochmoore“ (siehe oben p. 64). Bemerkenswert ist, daß den Poljesje-Mooren einige nordeuropäische Elemente fast ganz abgehen, die in den Waldmooren der nördlichen Umrandung mehr oder weniger häufig sind, wie *Eriophorum gracile*, *Carex loliacea*, *C. tenella*, *C. vaginata*, *Malaxis paludosa* (*Pedicularis sceptrum Carolinum* von Bialowies); auch *Aspidium cristatum*, in der Nähe der Schtschara so häufig, scheint sonst im Poljesje selten zu sein.

Die charakteristischen Pflanzen des Bruchwaldes sind in dem ganzen Poljesje die gleichen, wie sie oben in Kapitel 13 geschildert sind.

An sandig-lehmigen Ufern erscheint die oben p. 39 geschilderte Gesellschaft von *Cyperus flavescens*, *Scirpus palustris* und *ovatus*, *Peplis Portula*, *Limosella aquatica*, *Veronica anagallis* und *V. beccabunga* und außerdem die in unserem Gebiete nicht beobachteten *Cyperus fuscus*, *Scirpus acicularis*, *Hippuris vulgaris*, *Pulicaria vulgaris* usw.

Paczoski gibt von den Wäldern auf den diluvialen Inseln des Poljesje — Mischlaubwälder auf etwas besseren und Kiefernwälder auf trockenen sandigen Böden — Artenlisten, die den oben von den „Kiefernwäldern“ und „Kiefern-mischwäldern“ des Hügelrandes der großen Niederung in der Hauptsache entsprechen, aber auch manche hier nicht beobachtete Art enthalten. Es sind das meist Pflanzen, die auch der Bialowieser Wald dem Schtschara-Walde voraus hat (siehe oben p. 69), deren Fehlen also wohl mehr auf lokale Zufälligkeiten als auf große pflanzengeographische Zusammenhänge zurückzuführen ist. Besonders erwähnt sei unter den sowohl an der Schtschara wie auch in Bialowies vermißten Poljesje-Waldpflanzen die dem Steppenelemente angehörige *Jurinea cyanoides*.

Floristisch-Statistisches und -Geographisches.

In dem untersuchten Gebiete wurden etwa 650 Gefäßpflanzen festgestellt, von denen ungefähr 30 als angepflanzt, verwildert oder eingeschleppt anzusehen sind. Von den Einheimischen gehören nahezu 50 Proz. den Lebensgemeinschaften der Wälder, Triften und Heiden, etwa 30 Proz. den Mooren, Gewässern und ihren Ufern an, und etwa 20 Proz. können als Kulturbegleiter im weitesten Sinne dieses Wortes angesehen werden.

Ueber den Anteil der floristisch-geographischen Elemente an der Vegetation läßt sich zunächst zusammenfassend sagen, daß das atlantische Element

erklärlicherweise ganz fehlt, das pontische wider Erwarten durchaus zurücktritt, das nordeuropäische besonders auf den Mooren eine bemerkenswerte Rolle spielt und die Glieder des mitteleuropäischen Waldgebietes die Hauptmasse unter begreiflicher Betonung des östlichen Einschlag ausmachen.

Der kalte, feuchte Boden, der bis weit in das Frühjahr hinein unter dem Einflusse des Schmelzwassers steht, begünstigt das Auftreten borealer (boreal-alpiner) und verwandter Arten. Hilbert (1916) führt deren etwa 50 auf. Nach meinen Beobachtungen rechnen in den natürlichen Vereinen etwa 15 Proz. zu diesen kälteliebenden Pflanzen, ein verhältnismäßig hoher Prozentsatz, der sich noch beträchtlich steigert, wenn man nur die Moorvereine berücksichtigt. Die wichtigsten Angehörigen dieser Gruppe auf den Mooren sind: *Aspidium cristatum*, *Scheuchzeria palustris*, *Calamagrostis neglecta*, *Scirpus caespitosus*, *Carex chordorrhiza*, *C. loliacea*, *C. tenella*, *C. sparsiflora* var. *Gruetteri*, *Malaxis paludosa*, *Salix depressa* var. *livida*, *S. lapponum*, *S. myrtilloides*, *Betula humilis*, *Ledum palustre*, *Chamaedaphne calyculata*.

Ausgesprochene pontische Vereine fallen ganz aus. Wohl aber findet sich die eine oder andere Pflanze, deren Verbreitungszentrum im pontischen oder auch im Mediterran-Gebiete liegt, so z. B. auf den Sandfeldern: *Corynephorus canescens*, *Silene armeria*, *Astragalus arenarius*, *Peucedanum oreoselinum*, *Artemisia campestris*. Andere haben sich im lichten, trockenen Kiefernwalde eine Zufluchtsstätte gesichert, wie *Anthericum ramosum*, *Trifolium alpestre*, *Coronilla varia*. In der Buschtrift findet sich das pontisch-pannonische *Hieracium auriculoides* Láng. Auch weitere nicht gerade mediterran-pontische Arten, aber Arten, die in Deutschland freie, sonnige Standorte bevorzugen und auch in den südrussischen Steppen eine Rolle spielen wie *Polygala comosa*, *Viola arenaria*, *Brunella grandiflora*, *Veronica spicata*, *Carlina vulgaris* usw., sind an der Schtschara Waldpflanzen geworden.

Anhangsweise möge hier noch auf einige sonstige beachtenswerte Standorts-Wechsel hingewiesen werden. Daß *Calluna* sich unter dem Einfluß des trockeneren östlichen Klimas in den Schutz des Waldes zurückzuziehen neigt, wurde schon oben (p. 15) betont. *Arnica montana*, die im Westen Deutschlands besonders Moor- und Waldwiesen liebt, bevorzugt Triften und lichte, trockene Wälder. *Epilobium Lamyi* wächst im warmen, trockenen Rheingebiet an ganz offenen, der Sonne ausgesetzten Stellen, an der Schtschara dagegen auf Waldlichtungen und an Waldrändern, und das *E. collinum* der steinigten, felsigen Orte der Gebirge tut hier mit kiesigem Sande seiner Vorliebe für Kieselgehalt des Bodens Genüge.

Von Arten, die in Mitteleuropa „als bezeichnende Glieder der Bergregion gelten können und zu dem besonderen Gepräge derselben wesentlich beitragen“ (Wangerin, 1919, p. 45) finden sich im Gebiete 25 Arten:

Aspidium dryopteris, *Lycopodium selago*, *L. annotinum*, *Poa remota*, *Carex montana*, *Juncus filiformis*, *Coeloglossum viride*, *Listera cordata*, *Alnus incana*, *Ulmus scabra*, *Aquilegia vulgaris*, *Cardamine flexuosa* With., *Dentaria bulbifera*, *Rubus saxatilis*, *Trifolium spadiceum*, *Vicia silvatica*, *Geranium silvaticum*, *Daphne mezereum*, *Circaea alpina*, *Pirola uniflora*, *P. media*, *Trientalis europaea*, *Polemonium coeruleum*, *Arnica montana*, *Crepis praemorsa*. Es sind fast durchweg Waldpflanzen. Wangerin (1919) gibt in seiner Aufzählung 109 an. Im Bialowieser Walde finden sich davon noch eine ganze Reihe mehr als an der Schtschara. Die eigentümliche Erscheinung des Auftretens so vieler „montaner“ Arten im östlichen Flachlande unter Ueberspringung großer Verbreitungslücken ist noch wenig geklärt. Auch Wangerin muß die Frage, ob es sich dabei um die Einwirkung klimatischer Einflüsse oder mehr um florenentwicklungsgeschichtliche Momente handelt, noch offen lassen. Es ist wohl sicher, daß die Art und Weise des Ausklingens der montanen Pflanzen nach Osten hin für die Lösung des Problems von erheblicher Bedeutung ist. Eine gründliche Schilderung des Bialowieser Waldes wird hoffentlich bald in dieser Hinsicht weiteres Material liefern.

Bemerkenswert ist auch das Vorkommen des montanen (bis alpinen) *Epilobium collinum* im Gebiete und des in der norddeutschen Tiefebene bisher wenig beobachteten, allerdings wohl vielfach mit *E. adnatum* verwechselten *E. Lamyi*.

Im folgenden sei noch eine kurze Uebersicht aller der Pflanzen des Gebietes — ohne Rücksicht auf das floristisch-geographische Element, dem sie angehören — gegeben, die im mitteleuropäischen Flachlande eine ausgesprochene Zunahme nach Osten hin aufweisen, die also in der nordwestdeutschen Tiefebene fehlen oder doch selten sind oder gar erst im Osten der Weichsel auftreten. Hier sind in erster Linie zu nennen:

Carex loliacea, *C. tenella*, *C. sparsiflora* var. *Gruetteri*, *Gymnadenia conopsea*, *Salix dasyclados*, *S. depressa* var. *livida*, *S. lapponum*, *S. myrtilloides*, *Betula humilis*, *Dianthus arenarius*, *Stellaria Friesiana*, *Nymphaea candida*, *Geum strictum*, *Agrimonia pilosa*, *Trifolium spadiceum*, *T. lupinaster*, *Evonymus verrucosa*, *Epilobium Graebneri*¹, *Chamaedaphne calyculata*, *Leonurus cardiaca* var. *villosus*, *Galium vernum*, *G. Schultesii*, *Bidens radiatus*, *Achillea cartilaginea*, *Centaurea phrygia*.

Es treten in zweiter Linie hinzu:

Equisetum pratense, *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*, *Picea*

Diese Art wurde von K. Rubner im Walde von Bialowies entdeckt und in Fedde, Rep. XV, p. 179, 1918 beschrieben. Sie ist (Rubner briefl.) bis jetzt auch für das Gouv. Pskow und für Livland und Kurland nachgewiesen und sicher noch weiter verbreitet.

excelsa, Hierochloë australis, Calamagrostis neglecta, Koeleria cristata, Poa remota, Carex chordorrhiza, Luzula campestris subsp. pallescens, Gladiolus imbricatus, Coeloglossum viride, Listera cordata, Goodyera repens, Salix nigricans, Alnus incana, Ulmus scabra, Thesium ebracteatum, Asarum europaeum, Herniaria glabra var. puberula, Aquilegia vulgaris, Pulsatilla patens, Dentaria bulbifera, Berteroa incana, Potentilla norvegica, Trifolium montanum, T. alpestre, Astragalus glycyphyllos, A. danicus, A. arenarius, Vicia silvatica, Geranium pratense, Polygala comosa, Acer platanoides, Viola epipsila, Daphne mezereum, Cnidium venosum, Peucedanum oreoselinum, Chimophila umbellata, Pirola media, Ledum palustre, Arctostaphylos uva ursi, Polemonium coeruleum, Brunella grandiflora, Galeopsis pubescens, Calamintha acinos, Origanum vulgare, Verbascum thapsiforme, Veronica spicata, V. Dillenii, Melampyrum nemorosum, Lathraea squamaria, Linnaea borealis, Campanula patula, C. bononiensis, Helichrysum arenarium, Senecio vernalis, S. paludosus, Scorzonera humilis, Crepis praemorsa. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß von den 13 im Gebiete nachgewiesenen Arten und Unterarten der Gattung Hieracium nicht weniger als 9 hier mitzuzählen sind — ein Beweis dafür, daß die Formen solcher labilen Geschlechter bei floristisch-geographischen Untersuchungen recht bedeutungsvoll sein können —: H. pilosella subsp. stenodes N. P., H. flagellare subsp. flagellare N. P. und cernuiforme N. P., H. auricula subsp. littuanicum N. P., H. floribundum subsp. floribundum N. P., H. florentinum subsp. aquilonare (N. P.) Zahn, H. pratense subsp. silviculum (Fr.) Zahn, H. cymosum subsp. cymigerum (Rechb.) N. P., H. auriculoides Láng.

In der „Uebersicht über die Florenreiche und Florengebiete der Erde“ unterscheidet Engler (1919) in seiner Sarmatischen Provinz die Unterprovinzen: a) Westsarmatisches Tiefland mit den Bezirken: 1. Mittel-elbisches Flach- und Hügelland, 2. Mittleres Oderland und b) Ostsarmatisches Tiefland (Mittleres Weichselland mit dem südlichen Ost- und Westpreußen, dem südlichen Litauen, Polen und dem ebenen Wolhynien). Zu letztgenannter Unterprovinz gehört auch unser Gebiet. Die Verwandtschaft der beiden Unterprovinzen untereinander, aber auch den Gegensatz gegeneinander zeigt recht deutlich ein Vergleich der Schtschara-Vegetation mit der des Elbe- und Odergebietes: Uebereinstimmung in der Hauptmasse, aber an der Schtschara ein starkes Hervortreten östlicher Typen gegenüber dem Westen. Gegenüber der nördlich angrenzenden Unterprovinz „Kurland und Litauen“ der Mittelbaltischen Provinz sind die Gegensätze stärker, wie ein Vergleich unseres Gebietes mit dem von Lehmann behandelten Polnisch-Livland zeigt. Nach Süden hin grenzt die Pontische Provinz an. Die Scheidelinie geht durch das Poljesje. In dessen südlichem Teile treten auf den Landinseln,

wie die Arbeiten von Tanfiljew (1895) und Paczowski (1900) zeigen, schon echte Steppenbilder in Erscheinung, während sie im nördlichen Teile durchaus fehlen. Das Poljesje bildete und bildet für das Steppenelement eine unüberwindliche Barriere. Wenn auch die Sandschollen als Brücke dienen könnten, so sind doch die klimatischen Verhältnisse der Niederung den pontischen Pflanzen allzu ungünstig. Eine Umgehung der Barriere ist bei ihrer gewaltigen Längenausdehnung schwer möglich, auch schließt sich im Westen der „Bezirk des ostpolnischen Sumpfgebietes“ (Pax, 1918) an. Die einzige Pflanze, die den Eindruck macht, als ob ihr die Ueberquerung gelungen sein könne, ist *Silene armeria*. Aber auch bei dieser, einer nicht unbeliebten Zierpflanze, ist doch vielleicht noch eher an eine durch den Menschen beeinflusste Ausbreitung zu denken.

Zum Schlusse seien noch einige wichtigeren von Lehmann (1895 bis 1896) für die Gouvernements Grodno und Minsk nicht genannte Formen angeführt: Für beide Gouvernements sind neu: *Aspidium cristatum* $\times$ *spinulosum*, *Elodea canadensis*, *Eriophorum gracile*, *Carex tenella*, *C. sparsiflora* var. *Gruetteri*, *Rumex maritimus*, *Polygonum dumetorum*, *Nymphaea candida*, *Epilobium Graebneri*, *E. collinum*, *E. Lamyi*, *Euphrasia stricta* var. *brevipila*, *E. curta*, *Cirsium lanceolatum* subsp. *silvaticum*, weiter nach Hilbert: *Arum maculatum* und *Bidens radiatus*. Für Grodno neu: *Juncus capitatus*, *Salix myrtilloides*, *Achillea cartilaginea*. Für Minsk neu: *Carex loliacea*, *Listera cordata*, *Malaxis paludosa*, *Linnaea borealis*.

Literaturliste.

- Brandt, B., 1917. Die Sümpfe Westrußlands. — Zeitschr. Ges. f. Erdkunde, Berlin.
 Cajander, A. K., 1909. Ueber Waldtypen. — Fennia XXVIII, Helsingfors.
 Engler, A., 1914. Pflanzengeographie. — Kultur der Gegenwart III, v. 4, Leipzig.
 — 1919. Syllabus der Pflanzenfamilien. 8. Auflage. — Berlin.
 Flahault, Ch. und Schröter, C., 1910. Phytogeogr. Nomenklatur. — Zürich.
 Gams, H., 1918. Prinzipienfragen der Vegetationsforschung. — Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich, LXIII.
 Gradmann, R., 1909. Ueber Begriffsbildung in der Lehre von den Pflanzenformationen. — Engl. Bot. Jahrb. XLIII, Leipzig.
 Graebner, P., 1901. Die Heide Norddeutschlands. — Vegetation der Erde V, Leipzig.
 — 1909. Die Pflanzenwelt Deutschlands. — Leipzig.
 — 1918. Die pflanzengeogr. Verhältnisse von Bialowies. — „Bialowies in deutscher Verwaltung“ IV, Berlin.

- Groß, H., 1912. Ostpreußens Moore. — Schriften Phys.-Oekon. Ges. Königsberg LIII.
- Hilbert, R., 1916. Der arktisch-alpine Einschlag der Flora der Rokitosümpfe. — Allg. Bot. Zeitschr. XXII, Karlsruhe.
- 1917. Die Rokitosümpfe in naturwissenschaftlicher Beziehung. — 40. Ber. Westpreuß. Bot.-Zool. Vereins, Danzig.
- Hult, R., 1881. Försök till analytisk behandling af växtformationerna. — Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennica VIII, Helsingfors.
- Immanuel, F., 1894. Die Trockenlegung des Poljesje. — Globus LXVI, Braunschweig.
- Kuchinka, G., 1911. Das Polesie im westlichen Rußland. — Petermanns Mitteil. LVII, 2, Gotha.
- Lautenschlager, O., 1917. Die forstlichen Verhältnisse des Bialowieser Urwaldes. — „Bialowies in deutscher Verwaltung“ II, Berlin.
- Lehmann, E., 1895—96. Flora von Polnisch-Livland nebst Nachtrag. — Arch. Naturk. Liv-, Esth-, Kurlands XI, Dorpat.
- Paczoski, J., 1900. Ueber die Formationen und die Herkunft der Flora des Poljesje. (Polnisch). — Pamietnik Fizyograficzny XVI, Warschau.
- Pax, F., 1918. Pflanzengeographie von Polen (Kongreß-Polen). — Beiträge zur Poln. Landeskunde A I, Berlin.
- Potonié, H., 1909. Die Bildung der Moore. — Zeitschr. Ges. Erdkunde 1909, Berlin.
- Regel, K., 1913. Die Vegetation der Sümpfe des nördl. Teils des Poljesje-Gebietes und der Einfluß der Entwässerung und Bewässerung auf dieselbe. (Russ. mit deutschem Auszug). — Bull. f. angewandte Bot. VI, St. Petersburg.
- Reinhard, L., 1891. Liste der Pflanzen des südlichen Teiles des Gouvernements Grodno (Kreis Slonim). [Russisch]. — Travaux de la Société des naturalistes à l'Université Imperiale de Kharkow. T. XXV.
- Rubner, K., 1918. Urwald oder Kulturwald? — „Bialowies in deutscher Verwaltung“ IV, Berlin.
- Schottler, W., 1919. Beiträge zur Geologie und Bodenkunde des Bialowieser Urwaldes. — „Bialowies in deutscher Verwaltung“ V, Berlin.
- Steinecke, Fr., 1918. Die Kryptogamen im Urwalde. — „Bialowies in deutscher Verwaltung“ IV, Berlin.
- Tanfiljew, G. J., 1895. Sümpfe und Torfmoore des Poljesje. [Russ.]. — Veröffentl. Abteil. f. Bodenmelioration Minist. f. Landwirtsch. u. Domänen, St. Petersburg (Besprechung in Bot. Centrbl. LXVI, 1896, p. 250—253).
- Wangerin, W., 1915. Vorläufige Beiträge zur kartogr. Darstellung der Vegetationsformationen im nordostdeutschen Flachland unter besonderer Berücksichtigung der Moore. — Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXIII, Berlin.
- 1919. Die montanen Elemente in der Flora des nordostdeutschen Flachlandes. — Schrift. Naturf. Ges. Danzig, N. F. XV, 1.
- Warming, E., 1920. Bemerkungen über Lebensform und Standort. — Englers Bot. Jahrb. LVI, Leipzig.
- Warming, E. und Graebner, P., 1914—18. Lehrbuch der ökolog. Pflanzengeographie. — 3. Aufl., Berlin.
- Woldstedt, P., 1920. Die Durchbrüche von Schtschara und Bug durch den Westrussischen Landrücken. — Zeitschr. Ges. f. Erdkunde, Berlin.